ORALVEX® bain de bouche

hexétidine

FORMES et PRÉSENTATIONS (début page)

Bain de bouche à 0,1 % : Flacon de 125 ml.

COMPOSITION (début page)

	p 15 ml
Hexétidine (DCI)	15 mg

Excipients : polysorbate 60, saccharine sodique, salicylate de méthyle, huile essentielle de girofle, menthol, huile essentielle d'anis, de menthe poivrée, d'eucalyptus, azorubine 85 % (E 122), acide citrique monohydraté, éthanol à 96 %, eau purifiée.

DC INDICATIONS (début page)

Traitement local d'appoint des affections de la cavité buccale et soins postopératoires en stomatologie.

DC POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION (début page)

Oralvex s'emploie pur ou dilué en bains de bouche 2 ou 3 fois par jour :

- pur : 1 cuillère a soupe ;
- dilué : à utiliser dilué s'il apparaît des manifestations douloureuses.
  Ne pas avaler ce produit.

DC CONTRE-INDICATIONS (début page)

- Hypersensibilité à l'hexétidine ou à l'un des excipients.
- Enfant de moins de 6 ans.

DC MISES EN GARDE et PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (début page)

Mises en garde :

L'indication ne justifie pas un traitement prolongé, d'autant qu'il pourrait exposer à un déséquilibre de la flore microbienne normale de la cavité buccale.

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques, en tant qu'excipients, qui peuvent abaisser le seuil épileptogène. A doses excessives, risque d'accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respecter les posologies et la durée de traitement préconisées.

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (azorubine E 122) et peut provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament contient de faibles quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.

Précautions d'emploi :

Le traitement usuel ne dépassera pas 10 jours ; au-delà, la conduite à tenir devra être réévaluée.

En cas d'antécédents d'épilepsie, tenir compte de la présence, en tant qu'excipients, de dérivés terpéniques.

DC INTERACTIONS (début page)

Les données disponibles à ce jour ne laissent pas supposer l'existence d'interactions cliniquement significatives.

DC FERTILITÉ/GROSSESSE/ALLAITEMENT (début page)

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament du fait :

- de l'absence de donnée cinétique sur le passage des dérivés terpéniques dans le lait,
- et de leur toxicité neurologique potentielle chez le nourrisson.

DC EFFETS INDÉSIRABLES (début page)

Des manifestations d'hypersensibilité généralement cutanéomuqueuses d'allure allergique, en particulier angioedèmes, et des réactions locales ont été rapportées.
En raison de la présence en tant qu'excipients de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées :

- risque de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant,
- possibilité d'agitation et de confusion chez les sujets âgés.

DC SURDOSAGE (début page)

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques, en tant qu'excipients, qui peuvent abaisser le seuil épileptogène et entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques chez l'enfant (à type de convulsions) et chez les sujets âgés (à type d'agitation et de confusion). Respecter les posologies et la durée de traitement préconisées (cf Posologie et Mode d'administration).

PP PHARMACODYNAMIE (début page)

Classe pharmacothérapeutique : antiseptique.

DP MODALITÉS DE CONSERVATION (début page)

Durée de conservation :

2 ans.

A conserver à une température ne dépassant pas + 25 °C et conserver le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur.