

TADALIS® 20 mg

Tadalafil

Comprimés pelliculés sécables

1- PRESENTATION

Boîte de 2 ou 8 comprimés pelliculés, sécables.

2- COMPOSITION

- Substance active

Tadalafil20mg

- Excipients

Lactose, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, laurylsulfate de sodium, povidone, stéarate de magnésium, opadry (hypromellose, talc, dioxyde de titane, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, maltodextrine)

Excipient à effet notoire : lactose

3- CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inducteur d'érection inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5.

4- INDICATIONS THERAPEUTIQUES

TADALIS® est un médicament pour les hommes qui ne peuvent atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle. C'est un inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5. Il agit, après une stimulation sexuelle indispensable, en augmentant le flux sanguin dans le pénis.

5- CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais TADALIS® :

- si vous êtes allergique au tadalafil ou à l'un des autres constituants du médicament,
- si vous prenez des dérivés nitrés pour le traitement de l'angine de poitrine (prévenez votre médecin),
- si vous souffrez de maladie cardiaque,
- si vous avez eu récemment un accident vasculaire cérébral,
- si vous avez des problèmes de tension artérielle non contrôlés,
- si vous avez eu une perte de la vision suite à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique.

6-PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES

Informez votre médecin :

- si vous avez un problème cardiaque,
- si vous avez une drépanocytose (malformation des globules rouges), un cancer de la moelle osseuse, une leucémie, une déformation du pénis.
- si vous souffrez d'une maladie susceptible de prédisposer le patient au priapisme (érection prolonger et douloureuse).
- si vous souffrez d'un grave problème de foie ou de reins.

En cas de changement important de la vision (diminution ou perte de vision), arrêtez de prendre TADALIS® et prévenez votre médecin.

TADALIS® n'est pas indiqué chez les femmes ou les patients de moins de 18 ans.

7- INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

Si vous suivez un traitement à base de dérivés nitrés, vous ne devez pas prendre TADALIS®.

Informez votre médecin si vous prenez :

- un alpha-bloquant,
- un médicament pour traiter l'hypertension artérielle,

- un médicament inhibiteur de l'enzyme CyP3A4 (du type kétoconazole ou un inhibiteur de protéases pour le traitement du VIH),

- un autre médicament pour corriger la fonction érectile.

Il est préférable d'informer votre médecin de tout traitement en cours.

La prise d'alcool doit être modérée si vous envisagez de prendre TADALIS® en raison des risques de vertige accentués.

8-CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Attention à votre comportement au volant après la prise de TADALIS®.

Des sensations de vertige peuvent être ressenties chez certains patients.

9- POSOLOGIE

TADALIS® peut être pris pendant ou en dehors des repas, au moins 30 minutes avant l'activité sexuelle.

TADALIS® peut rester efficace pendant 36 heures après la prise du comprimé.

La dose recommandée est de 10 mg au départ, par voie orale avec un peu d'eau, mais elle peut être augmentée à 20 mg.

Ne prenez pas TADALIS® plus d'une fois par jour, ni en utilisation quotidienne prolongée.

10- INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSAGE

Informez votre médecin si vous avez pris une dose supérieure à celle recommandée.

11- EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, TADALIS® est susceptible d'avoir des effets indésirables ;

Les effets les plus fréquents sont des maux de tête et des troubles digestifs.

Certains autres effets peuvent être ressentis, de fréquence variable.

- assez fréquemment : douleurs dorsales et musculaires, bouffées de chaleur et congestion nasale, sensations de vertiges, palpitations, douleurs abdominales.

- moins fréquemment : allergies à type d'éruptions cutanées et urticaires, problèmes oculaires (vision trouble, œdèmes des paupières, douleurs oculaires, yeux rouges), saignement de nez, perturbation de la pression artérielle, douleur thoracique (prévenez immédiatement votre médecin dans ce dernier cas, sans prendre de dérivés nitrés).

- plus rarement : évanouissements, migraine, gonflement du visage, érection prolongée et parfois douloureuse (prévenez votre médecin si elle dure plus de 4 h).

Informez votre médecin de tout effet indésirable que vous pourriez ressentir.

12- COMMENT CONSERVER TADALIS®

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C, dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Liste 1

Médicament autorisé n° : 09/ 25 N 052 /447

Fabricant /Conditionneur/Exploitant :



Laboratoires BEKER, Algérie

ZA, extension Dar El Beïda, 16100, Alger

تاداليس 20 تادالفيل

1 . الشكل و التقديم :
تاداليس 20 2 8

2 . التركيب و الكيفي :
تادالفيل 20.....

سيليلوز ميكروكريستالين كروسكارميلوز صوديوم لوريل سلفات صوديوم بوفيدون
ستيرات مغنزيوم (أبروميلوز أكسيد الحديد الأحمر أكسيد الحديد الأصفر
أكسيد التيتان مالتودكسترين).
- سواغ ذات فعالية :

3 . التصنيف الصيدلي العلاجي :
عملية القضيب.

4 . :
تاداليس دواء مخصص للرجال الذي ليس لديهم القدرة الكافية لتنصاب القضيب أو ضعفه أثناء
الجنسية. فهو للأنزيم فوسفو ديستراز 5. فعالية الدواء التحفيز
و ذلك بزيادة الدورة الدموية للقضيب.

5 . :
ياخذ تاداليس:

إذا كانت لديكم حساسية لتدالفيل أو لأحد مكونات هذا الدواء.
كنتم تأخذون مشتقات النيتري لمعالجة الذبحة الصدرية(بلغوا طبيبك).

صبيتم حديثا بحادث في الأوعية الدماغية.
كانت لديكم مشاكل في الضغط الشرياني الغير المراقب.

الغير شرياني..

6 . احتيا :
طبيبي :

إذا كانت لديكم مشاكل في القلب.
وجود الكريات المنجلية (تشوه في كريات الحمراء) ابيضاض الدم
القضيب.

سبب في تهينة المريض إلى القسوح (نعوط طويل و مؤلم)
إذا كنتم تعانيون من مشكل خطير

في حالة تغير هام في مهام العين (نقصان أو فقدان البصر) يجب توقف في
الطبيب ملزومة.
المرأة غير معنية بحالات الاستعمال العلاجية لهذا أيضا الأشخاص ما تحت 18

7 . التداخلات الدوائية:

أدوية من مشتقات النيتري فممنوع عليكم داليس.
يجب اخبار طبيبي :

ضغط الشرياني.

الأنزيم Cyp3A4) كيتوكونازول او م البروتياز

سيديا).

ي عملية الانتصاب .

ستحسن اخبار طبيبك عن أي دواء آخر تأخذونه .
يجب التقليل من شرب الكحول أثناء الشروع في أخذ الدواء بسبب إمكانية شعور بالدوخة الكبيرة.

8 . سياقة المركبات و استعمال الآلات :
يجب الاحتياط

لسبب إمكانية شعور بالدوخة عند بعض

9 . المقادير :

ياخذ تاداليس
يمكن أن يبقى تاداليس فعال لمدة 36 ساعة بعد تناوله.
المقدار الاعتيادي في البداية هي 10 ياخذ عن طريق الفم مع قليل من
يمكن 20

ي تاداليس في اليوم و ليس بصفة مستمرة.

10 . :

يجب الطبيب

11 . التأثيرات الجانبية :

ككل الأدوية يمكن أن يؤدي هذا الدواء إلى تأثيرات مزعجة :
الأكثر انتشارا هي أوجاع الرأس و اضطرابات هضمية.
الأعراض الأخرى المنتشرة بصفة متفاوتة هي:
قليل : آلام الظهر الإحساس بالوهج

: حساسية من نوع طفح الجلدي
مشاكل بصرية (نظر مضطرب
جوف العين آلام بصرية احمرار العين) نزيف الأنف
صدرية (إبلاغ فورا الطبيب في الحالة الأخيرة مع الامتناع باخذ مشتقات النيتري).
الشقيقة انتفاخ الوجه نعوط طويل و مؤلم (إبلاغ الطبيب إذا دامت
هذه الحالة أكثر من 4).
يجب إعلام الطبيب بكل تأثير غير مرغوب و مزعج بها.

12 . الاحتياطات خاصة بالحفظ :

يحفظ 30 درجة مئوية و في العبوة الخاصة به بعيدا عن الرطوبة.
لا يترك في متناول الأطفال
ز مدة الصلاحية

1

دواء مرخص به تحت الرقم : 09/ 25 N 052 /447

BEKER
LABORATOIRES

مخابر بيكير

ية للدار البيضاء 16100