Bronchocalm®

Sirop

Enfants

Flacon 125 ml

Bromhydrate de dextrométhorphane 0.1 POUR CENT

Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.
- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition pour 100 ml
Bromhydrate de dextrométhorphane.....0,100 g

Excipients : parahydroxybenzoate de méthyle (E218), solution de saccharose, arôme banane, eau purifiée.

1 cuillère-mesure (5 ml) contient 5 mg de bromhydrate de dextrométhorphane et 2,9 g de saccharose.

Forme pharmaceutique
Sirop. Flacon de 125 ml.

Classe pharmaco-thérapeutique :
ANTITUSSIF.
(R : système respiratoire).

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans).

3. ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- en cas d'allergie à l'un des constituants,
- en cas de toux chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- en association avec certains médicaments utilisés dans la dépression (IMAO).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE en association avec l'alcool.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :
Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.

Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, demandez l'avis de votre médecin.

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

Précautions d'emploi :
PREVENEZ VOTRE MEDECIN, en cas de maladie au long cours du foie.

La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée.

Il conviendra de ne pas associer un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique).

En cas de diabète ou de régime hypoglucidique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en saccharose (2,9 g par cuillère-mesure).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :
Ce médicament est contre-indiqué en association avec certains médicaments utilisés dans la dépression (IMAO).

BRONCHOCALM Enfants contient un antitussif, le dextrométhorphane. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec l'alcool, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement :
En cas de grossesse ou d'allaitement, l'usage de ce médicament est déconseillé.
D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Conducteurs et utilisateurs de machines :
L'attention est appelée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les possibilités de somnolence attachées à l'usage de ce médicament.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.
Il est préférable de commencer ce traitement le soir.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Parahydroxybenzoate de méthyle (E218), Saccharose (2,9 g par cuillère-mesure), Propylène glycol (arôme banane).

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie
RESERVE A L'ENFANT DE PLUS DE 20 kg (soit environ 6 ans)
En l'absence d'efficacité, n'augmentez pas les doses au-delà de ce qui est préconisé, ne prenez pas conjointement un autre antitussif, mais consultez votre médecin.

La posologie est fonction du poids de votre enfant, soit à titre indicatif :

- enfant de moins de 8 ans : conformez-vous à l'avis de votre médecin.
- enfant de 25 à 30 kg (environ 8 à 10 ans) : 1 cuillère-mesure par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 4 cuillères-mesure par jour.
- enfants de 30 à 40 kg (environ 10 à 12 ans):1 cuillère-mesure par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 cuillères-mesure par jour.
- enfant de 40 à 50 kg (environ 12 à 15 ans) : 2 cuillères-mesure par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 8 cuillères-mesure par jour.

En cas d'insuffisance hépatique, consultez votre médecin afin d'adapter la posologie.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :
- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

Mode et voie d'administration :
Voie orale.

Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré
Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Durée du traitement
Le traitement doit être court (quelques jours) et limité aux moments où survient la toux.

Conduite à tenir en cas de surdosage
Arrêtez le traitement et consultez rapidement un médecin.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : constipation, somnolence.
Rarement : nausées, vertige, gêne respiratoire, réactions cutanées allergiques.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Précautions particulières de conservation :
A conserver à une température inférieure à 25°C.

7. DERNIERE DATE A LAQUELLE CETTE NOTICE A ETE APPROUVEE

Décembre 2008

Décision d'enregistrement n° :
153 / 20 C 207 / 05

Titulaire d'AMM :
Laboratoire ELAIAPHARM
Fabriqué et exploité par : LGPA
Z.I. de Réghaia. Route de la Gare Alger. Algérie
Sous licence : Laboratoire ELAIAPHARM
2881, route des crêtes. BP 205 Valbonne 06904
Sophia Antipolis Cedex France.

P1 1055 02

LGPA