CARBODAL^{G} 5%
Carbocystéine
Solution buvable

COMPOSITION : **Substance active :** Carbocystéine.....5 g/100 ml
Excipients : Hydroxyde sodique, propylène glycol, hydroxyéthylcellulose, saccharine sodique, parahydroxybenzoate de methyl sodé, parahydroxybenzoate de propyl sodé, colorant Ponceau E124, arôme de fraise, eau purifiée.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :
Sodium, parahydroxybenzoate de methyl sodé, parahydroxybenzoate de propyl sodé, colorant ponceau E124.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION :
Solution buvable: flacon de 125 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Mucolytique- expectorant

INDICATIONS :
Ce médicament fluidifie les sécrétions (mucosités) présentes dans les bronches. Il facilite leur évacuation par la toux (expectoration).
Ce médicament est réservé à l'adulte et l'adolescent de plus de 15 ans.
Il est utilisé en cas de toux grasse récente avec difficulté à expectorer.

POSOLOGIE / MODE D'ADMINISTRATION :
Posologie
- La dose habituelle est de 1 cuillère à soupe (15 ml) 3 fois par jour (matin midi et soir), en dehors des repas.
- 1 cuillère à soupe de 15 ml contient 750 mg de carbocystéine.
- Si vous suivez un régime sans sucre ou pauvre en sucre, ce médicament est adapté à votre régime.

Mode d'administration
Voie orale
Durée du traitement
Ne dépassez pas 5 jours de traitement. Consultez votre médecin si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours de traitement.

CONTRE INDICATIONS :
Ne prenez jamais CARBODAL 5% :
- si vous êtes allergique à la carbocistéine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (notamment aux parahydroxybenzoates).

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Vous ne devez pas utiliser de médicaments qui empêchent la toux (antitussifs) ou qui assèchent les secrétions bronchiques quand vous prenez CARBODAL 5%. En effet, ce médicament fluidifie les sécrétions, ce qui facilite leur évacuation par la toux. La toux est utile pour expectorer.
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre CARBODAL 5% :
- Si vous avez de la fièvre ou si votre expectoration est « verdâtre ».
- Si vous souffrez d'une maladie chronique des bronches ou des poumons.
- Si vous avez un ulcère digestif (de l'estomac ou de l'intestin).
- Chez les sujets âgés.
- En cas d'administration concomitante avec des médicaments susceptibles de provoquer des saignements de l'estomac ou de l'intestin.

- Ce médicament contient du sodium. Vous devez en tenir compte si vous suivez un régime sans sel ou pauvre en sel.

- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyl sodé et du parahydroxybenzoate de propyl sodé et peut provoquer des réactions allergiques.
- Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E124) et peut provoquer des réactions allergiques.

ADRESSEZ VOUS A VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Ce médicament contient de la carbocistéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses recommandées.

PREVENIR VOTRE MEDECIN SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS D'AUTRES MEDICAMENTS.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Il est possible d'allaiter votre enfant en cas de traitement par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Troubles digestifs tels que douleurs d'estomac, nausées, vomissements, diarrhées. Il est alors conseillé de réduire la posologie.
- Saignements de l'estomac ou de l'intestin. Le traitement doit être arrêté.
- Réactions cutanées allergiques telles qu'urticaire, démangeaison, éruption de plaques ou de boutons sur la peau, gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (œdème de Quincke). Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin.
- Éruption de plaques brunes ou violacées pouvant laisser une coloration sur la peau (érythème pigmenté fixe). Dans ce cas, vous devez consulter immédiatement votre médecin.
- Éruption de boutons avec parfois des bulles sur la peau pouvant aussi affecter la bouche (érythème polymorphe), éruption de bulles avec décollement de la peau pouvant s'étendre à tout le corps et mettre en danger le patient (Syndrome de Stevens-Johnson).

SURDOSAGE :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée des enfants.

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE : Juin 2018

DE N°: 07/20D042/318

FABRICANT, CONDITIONNEUR ET DETENTEUR DE LA DE:

Laboratoires PHARMIDAL NS
144, Z.I le RHUMEL Constantine ALGERIE
Tél. /Fax : 031 60 65 53/031 60 65 52

Pharmidal n.s