CLOGEL®

diclofénac Gel à 1%

FORME ET PÉSENTATION:

Gel à 1% pour application locale .

Tube de 30 g .

Chaque gramme de gel contient du diclofénac diéthylamine

Correspondant à 10 mg de diclofénac(D.C.I) sodique.

COMPOSITION:

Diclofénac de diéthylamine .....1.16 g .

Excipient .....qsp 100 g .

excipient à effets notoire: Propylène glycol .

CLASSE THÉRAPEUTIQUE :

Anti-inflammatoire non stéroïdien.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES:

- Maladies rhumatismales localisées comme l'ostéoarthrite.
- Les douleurs dorsales et des articulations périphériques.
- Formes rhumatismales localisées des tissus mous : bursite, ténosynovite et le syndrome de l'épaule main.
- Inflammation des ligaments, tendons, muscles et articulations due à un traumatisme comme les entorses, ecchymoses et contusions musculaires.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

USAGE EXTÉRNE . Voie cutanée .

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

CLOGEL doit être appliqué 2 à 4 fois par jour, en massant délicatement sur la partie douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après utilisation.

La durée du traitement est limitée à 5 jours, en l'absence de prescription médicale.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE:

En cas de surdosage : rincer abondamment à l'eau et appliquer éventuellement un traitement symptomatique.

CONTRE INDICATIONS:

Ce médicament NE DOIT PAS être utilisé dans les cas suivants:

- Allergie au diclofénac et aux substances d'activité proche telles que: autre AINS, aspirine.
- Allergie à l'un des excipients
- Peau lésée (dermatoses suintantes, eczéma, lésions infectées, brûlures ou plaies).
- Á partir du 6ème mois de grossesse.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur les yeux.

L'apparition d'une éruption cutanée, après application du gel, impose l'arrêt immédiat du traitement.

- Le port de gants par le masseur en cas d'utilisation intensive est obligatoire.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENTS EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS INDÉSIRABLES:

- Réactions cutanées locales d'hypersensibilité de type prurit érythème, éruption et sensation de brûlure.
- Réaction d'hypersensibilité : respiratoires (crise d'asthme) générales (type anaphylactique)
- Réactions de photosensibilité.

GROSSESSE ET ALLAITEMENTS

Ce médicament est contre-indiqué à partir du 6ème mois de grossesse.

Diclofénac passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'administrer chez la femme qui allaite .

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

CONSÉRVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur l'emballage .

Conserver dans un endroit sec entre 15°C-30°C ,

6 mois après ouverture.

LISTE II

Date de révision de la notice : juin 2009

Médicament enregistré : 10/00/21 A 004/003.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS Á LA PORTÉE DES ENFANTS

Fabriqué par Groupe Industriel SAIDAL - Site de production Dar EL-Beida - ALGERIE