LATENDRA®

Méthylsalicylate / Menthol / Camphre

FORME ET PRÉSENTATION:
Crème ; tube de 40 g.

COMPOSITION :
Méthylsalicylate ..... 30 g.
Menthol ..... 10 g.
Camphre ..... 4 g.
Excipients .....q.s.p 100 g.

CLASSE PHARMACO - THERAPEUTIQUE :
Antalgique.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :
Traitement local d'appoint des douleurs musculaires et tendinoligamentaires.

CONTRE - INDICATIONS :
Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** dans les cas suivants :

* Allergie aux salicylés, aux substances d'activité proche ou à un autre composant;
* Aux patients prenant des anticoagulants;
* Ne pas appliquer cette crème sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, un eczéma, une lésion infectée ou une plaie, ni sous pansement occlusif.
* Liés à la présence de dérivés terpéniques :
  - Nourrisson de moins de 30 mois,
  - Enfants ayant des antécédents de convulsions,
  - Enfants ayant des antécédents de crise d'épilepsie.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPECIALES :
Ce médicament contient des dérivés terpéniques (menthol, camphre) qui peuvent entraîner, à dose excessive, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.
Si une éruption ou une irritation survient, cesser l'emploi de cette crème.
L'application de la chaleur, notamment d'un coussin chauffant électrique, peut causer une irritation excessive de la peau ou une brûlure.
Cesser d'utiliser cette crème et consulter un médecin si la douleur s'aggrave ou si les symptômes persistent durant plus de 7 jours ou disparaissent pour réapparaître ensuite quelques jours plus tard.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas de :
Antécédent d'épilepsie, tenir compte de la présence des dérivés terpéniques.
Ne pas appliquer sur les seins en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :
En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament du fait de l'absence de données cinétiques sur le passage des dérivés terpéniques dans le lait et de leur toxicité neurologique potentielle chez le nourrisson.
D'UNE FACON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

POSOLOGIE :
Application locale.
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 7 ans.
Appliquer en massages locaux sur la zone douloureuse 2 à 3 fois par jour, jusqu'à pénétration complète.
Se laver les mains après utilisation.

EFFETS INDÉSIRABLES :
- Eventuelle réaction allergique locale nécessitant l'arrêt du traitement.
- Possibilité de réaction érythémateuse normale au point d'application.
- En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées :
  * Risque de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant,
  * Possibilité d'agitation et de confusion chez le sujet âgé.

SIGNALER A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION :
NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.
A conserver à une température entre 15°C et 30°C.
DE : 09/21F 056/003

NE JAMAIS LAISSER LES MÉDICAMENTS A LA PORTÉE DES ENFANTS

Fabricant et Détenteur de la DE

Groupe SAIDAL - BIOTIC - Usine El-Harrach - Algérie