Mentex®

EL KENDI

Composition :
Chaque 5 ml contient :
Diphénhydramine HCl 12,5 mg.
Dextrométhorphane HBr 15 mg.
Pseudoéphédrine HCl 30 mg.
Chlorure d'ammonium 125 mg.
Citrate de sodium 57 mg.
Menthol 1 mg.
Excipients : Saccharose, Saccharine Sodique, Sorbitol liquide 70%, Propylène Glycol, Acide Citrique monohydraté, Benzoate de Sodium, Colorant Caramel, Arôme liquide d'Orange, Arôme liquide de Chocolat Bourbon, Arôme liquide de Vanille et eau purifiée.
Excipients à effet notoire : Saccharose, Sorbitol.

Propriétés pharmacologiques :
Mentex® est un antitussif non narcotique, décongestionnant et expectorant, procurant un soulagement complet chez les sujets présentant une toux.

Diphenhydramine est un antagoniste H1, il est utilisé pour le traitement symptomatique des réactions d'hypersensibilité en bloquant les récepteurs d'histamine situés au niveau des tissus.

Dextromethorphane supprime le réflexe de toux par une action directe sur le centre tussigène au niveau de la Medulla. Son absorption est intestinale et son action débute en moins de 15 à 30 minutes.

Pseudoéphédrine agit indirectement comme sympathomimétique.
Il est d'abord utilisé pour décongestionner la muqueuse nasale et les trompes d'Eustache. La combinaison avec un antihistaminique peut procurer une synergie bénéfique lors des rhinites allergiques saisonnières, car les antihistaminiques seuls ne soulagent pas l'obstruction nasale.

Le Chlorure d'Ammonium et le Citrate de Sodium sont décongestionnants et sont surtout utilisés pour liquéfier les crachats épais et visqueux.

Le menthol a un effet antitussif dû à son action analgésique locale.

Indications :
- Soulagement de la toux de ses symptômes congestifs.
- Traitement de la fièvre qui peut être associée et des autres atteintes allergiques du tractus respiratoire haut.

Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contre-Indications :
Mentex® est contre-indiqué chez les sujets ayant une sensibilité antérieure connue à ce médicament ou à l'un de ses composants, et chez les sujets atteints d'hypertension sévère ou de coronaropathie.

Précautions d'emploi :
L'ajustement du dosage est recommandé en cas d'atteinte hépatique ou rénale sévère.

Mises en garde :
-Une attention particulière doit être apportée aux sujets présentant de l'hypertension, glaucome à angle rétréci, hypertrophie de la prostate, obstruction du col vésical, atteinte cardiaque ischémique ou hyperthyroïdie.
-Les conducteurs et utilisateurs de machines, doivent faire attention, Mentex peut entraîner une somnolence.
-Les diabétiques ne doivent pas négliger la dose de saccharose qui est de 3,25g pour chaque 5 ml de sirop.
-Lors de la grossesse, une attention particulière est recommandée lors de la prise de Mentex.

Interactions médicamenteuses :
Demander l'avis de votre médecin lors de l'association de Mentex avec d'autres médicaments sympathomimétiques, décongestionnants, suppresseurs d'appétit, amphétamines et amphétamines psycho stimulantes, agents antihypertenseurs et antihistaminiques.
L'utilisation concomitante de Mentex avec les inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO) peut entraîner une élévation de la pression sanguine.

Posologie et mode d'utilisation :
Adultes : 5 ml toutes les 4 à 6 heures.
Enfants : De 3 à 4 ans : 1,25 ml toutes les 6heures.
De 4 à 12 ans : 2,5 - 5 ml toutes les 6heures.

Surdosage :
En cas de surdosage, effectuer les mesures suivantes :
-Lavage gastrique.
-Contrôler les convulsions avec du Diazépam.
-Traitement symptomatique.

Effets indésirables :
L'effet secondaire le plus fréquent est la sédation, variant de la somnolence légère à l'endormissement profond, incluant aussi un vertige.
Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'apparition d'effets secondaires.

Conditions de conservation et de stockage :
Conserver à une température comprise entre (15-30) °C.
Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration, ou si le produit montre des signes de détérioration.

Présentation :
Flacon de 125 ml.

Date de révision de la notice : **04/2011**
Décision d'enregistrement N° : 08/22A035/352

Mentex® est une marque déposée.

Ceci est un médicament :

- Un médicament est un produit qui utilisé, en dehors de ses prescriptions, peut nuire à votre santé.
- Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin et aux conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien connaissent les risques éventuels de ce médicament.
- Ne pas arrêter les traitements sans l'accord de votre médecin ou pharmacien.
- Ne pas reprendre le médicament sans une nouvelle ordonnance du médecin.

Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.

Fabricant : EL KENDI Industrie du Médicament
Siège : Haouch Kaouche N°2, villa N° 14, Dely Ibrahim - Alger.
Usine : Z.A. Sidi Abdellah, Zéralda – Alger.

IN0007.05 210x148mm