Dioveine

DIOSMINE

300 mg

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

DIOVEINE 300 mg Comprimés pelliculés.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

DIOSMINE .....300,00 mg

Excipients : QSP 1 Comprimé pelliculé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés, boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

VASCULOPROTECTEURS

C : Système cardio-vasculaire

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est un veinotrope, vasculoprotecteur et veinotonique.

Il est préconisé pour :

- le traitement des symptômes en rapport avec l'insuffisance veino-lymphatique (jambes lourdes, douleurs, impatience du primo-décubitus).
- le traitement d'appoint des troubles fonctionnels de la fragilité capillaire.
- le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTERS INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTION ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE

La grossesse est une période normale de la vie de la femme où il est particulièrement important de ne pas prendre de médicament sans l'avis de son médecin.

De même, en cas de désir de grossesse, votre médecin doit toujours être prévenu. Aucun effet néfaste n'a été rapporté à ce jour.

ALLAITEMENT

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

a- POSOLOGIE

La posologie habituelle est de 2 comprimés par jour : 1 à midi et 1 le soir.

Dans la crise hémorroïdaire : la posologie est de 4 à 6 comprimés par jour.

b- MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

c- FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

1 comprimé à midi et 1 le soir au moment des repas.

EFFET NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

De rares cas : troubles digestifs banals n'obligeant jamais à l'arrêt du traitement.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITES ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

a- NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

b- PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

Fabriqué par :

BIOGALENIC

ZI Zighoud Youcef

25200 CONSTANTINE - Algérie