VENOSMIL®
Hidrosmina

FORMA FARMACÉUTICA
Cápsulas

COMPOSICIÓN
Cada cápsula contiene 200 mg de hidrosmina, como principio activo.
Los demás componentes son: Estearato de magnesio como excipiente.
La cápsula de gelatina está compuesta de: Gelatina, eritrosina (E127), amarillo de quinoleína (E104) y dióxido de titanio (E171).

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Hidrosmina es un fármaco de la familia química de los flavonoides que actúa sobre las consecuencias del estancamiento de sangre en las venas de las extremidades inferiores cuando estas son incapaces de desarrollar su función, lo que llamamos insuficiencia venosa, y que, generalmente es debido a varices o antiguas trombosis.

INDICACIONES
Venosmil se utiliza en el alivio a corto plazo (durante dos-tres meses) del edema y síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica (dolor, pesadez de piernas, hinchazón, etc.).

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.
No se conocen interacciones con los alimentos ni con otros medicamentos, en todo caso nunca debe tomar otro medicamento por iniciativa propia sin que se lo haya recomendado su médico.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES E INCOMPATIBILIDADES
Debería informar a su médico, ya que hay que tener especial cuidado en el uso de Venosmil, si presenta algunas de las siguientes situaciones:
- En alguna ocasión ha presentado una reacción de hipersensibilidad con este mismo medicamento o con alguno de los componentes del mismo.

Embarazo
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Debido a que no hay experiencia apropiada acerca de la seguridad de Venosmil en el embarazo, se debe evitar su uso durante el mismo.

Lactancia
Se desconoce si hidrosmina se elimina por leche materna, por lo que no se recomienda su uso si usted está en periodo de lactancia.

REACCIONES ADVERSAS
Generalmente este medicamento es bien tolerado.
Las reacciones adversas que se han observado con mayor frecuencia son de tipo digestivo (dolor gástrico, náuseas), relacionadas con el sistema nervioso (mareos, dolor de cabeza) y de tipo dermatológico (erupción, picor).
Si observa alguna otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Siga las recomendaciones de su médico sobre cuándo y cómo tomar este medicamento.
Vía oral exclusivamente.
Adultos:
La dosis habitual de Venosmil es de una cápsula de 200 mg tres veces al día, generalmente coincidiendo con las comidas principales. Una vez extraída del blister, la cápsula se debe ingerir directamente. Se puede acompañar de agua u otra bebida para facilitar su deglución.

TRATAMIENTO EN CASO DE INTOXICACIÓN O SOBREDOSIS
En este caso consulte al Servicio de Información Toxicológica o bien acuda a su médico.

PRESENTACIÓN
Envases conteniendo 20 y 60 cápsulas.

OTRAS PRESENTACIONES
VENOSMIL gel, tubo 60 g.

CONSERVACIÓN DE VENOSMIL
Conservar por debajo de 25ºC.
Caducidad
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

MANTÉNGASE VENOSMIL FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS
Venta con receta médica.

VENOSMIL®
Hidrosmine

FORME PHARMACEUTIQUE
Gélules

COMPOSITION
Chaque gélule contient 200 mg d'hidrosmine (principe actif).
Les autres composants sont les suivants: Stéarate de magnésium (excipient).
La gélule de gélatine se compose de: Gélatine, érythrosine (E127), jaune de quinoléine (E104) et dioxyde de titanium (E171).

ACTION PHARMACOLOGIQUE
L'hidrosmine est un produit pharmaceutique de la famille chimique des flavonoïdes qui agit sur les conséquences de l'épanchement de sang dans les veines des extrémités inférieures lorsque celles-ci sont incapables d'exercer leur fonction, autrement dit lorsqu'il se produit ce que l'on appelle insuffisance veineuse, affection généralement imputable à des varices ou d'anciennes thromboses.

INDICATIONS
Venosmil est employé pour soulager à court terme (pendant deux à trois mois) l'œdème et les symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique (douleur, jambes lourdes et enflées, etc.).

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET ALIMENTS
Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris ceux qui sont vendus sans ordonnance.
Aucune interaction avec les aliments ou d'autres médicaments n'a été établie; néanmoins, vous ne devez pas prendre d'autres médicaments de votre propre initiative si votre médecin ne vous les a pas prescrits.

CONTRE-INDICATIONS, PRÉCAUTIONS ET INCOMPATIBILITÉS
Des précautions doivent être prises lorsqu'on prend Venosmil dans les circonstances suivantes:
- En cas de précédants de réaction d'hypersensibilité à ce même médicament ou à un de ses composants.

Dans ces cas précis veuillez consulter votre médecin.

Grossesse
Si vous êtes enceinte ou si vous croyez l'être, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. L'innocuité de Venosmil au cours de la grossesse n'ayant pas été établie, il vaut mieux éviter d'en prendre pendant cette période.

Allaitement
On ignore si l'hidrosmine est éliminée par le lait maternel; son usage n'est donc pas recommandé en période d'allaitement.

RÉACTIONS ADVERSES
Ce médicament est généralement bien toléré.
Les réactions indésirables les plus fréquemment observées sont d'ordre digestif (douleur gastrique, nausées), liées au système nerveux (vertiges, maux de tête) et d'ordre dermatologique (éruption, sensation de brûlure).
Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

DOSE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Suivez les recommandations de votre médecin concernant l'espacement des prises et le mode d'administration. Voie orale exclusivement.
Adultes:
La posologie usuelle de Venosmil est de 1 gélule de 200 mg trois fois par jour, généralement au moment des principaux repas.
Après l'avoir retirée de son emballage plastique, avalez la gélule avec un peu d'eau ou une autre boisson afin d'en faciliter l'ingestion.

TRAITEMENT EN CAS D'INTOXICATION OU DE SURDOSE
Consultez votre médecin.

PRÉSENTATION
Boîtes de 20 et 60 gélules.

AUTRES PRÉSENTATIONS
VENOSMIL gel, tube à 60 g.

CONSERVATION
Conserver à une température inférieure à 25°C.
Péremption
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

NE LAISSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS
Sur ordonnance médicale.

VENOSMIL®
Hidrosmin

DOSAGE FORM
Capsules

COMPOSITION
Each capsule contains 200 mg of hidrosmin as the active ingredient.
The other components are: magnesium stearate excipient.
The gelatine capsule contains: Gelatine, erythrosine (E127), quinoline yellow (E104) and titanium dioxide (E171).

PHARMACOLOGICAL ACTION
Hidrosmin is a drug pertaining to the flavonoid family that combats the consequences of pooling of blood in the veins in the inferior extremities (also known as venous insufficiency) in those cases where difficulties in normal functioning are observed, a condition which is generally a result of varicose veins or old thrombosis.

INDICATIONS
Venosmil is used to provide short term relief (two-three months) of edemas and symptoms related with chronic venous insufficiency (pain, heavy legs, swelling, etc.).

INTERACTION WITH OTHER DRUGS AND FOODS
Inform your doctor or chemist if you are taking or have recently taken any other drugs, including those unprescribed by your doctor.
No interactions with food substances or other drugs have been observed, however, no other drugs should be taken, unless they have been prescribed by your doctor.

CONTRAINDICATIONS, PRECAUTIONS AND INCOMPATIBILITIES
Venosmil should be taken with extreme caution, therefore please consult your doctor should any of the following situations arise:
- If you observe any hypersensitive reactions to this drug or any of its components.

Pregnancy

ADVERSE EFFECTS
This drug is generally well-tolerated.
The most frequent adverse reactions observed are either of a digestive (gastric pain, nausea) or dermatological nature (eruptions, itching), or related with the nervous system (sickness, headaches).
Should you observe any adverse reactions other than those described previously, consult your doctor or chemist.

DOSE AND METHOD OF ADMINISTRATION
Follow your doctor's recommendations on when and how to take this drug. Oral use.
Adults:
The normal dose of Venosmil is one 200 mg capsule, three times a day, generally coinciding with meals. Once removed from the blister, the capsule should be taken immediately, either with water or any other liquid to ease deglutition.

TREATMENT IN CASE OF INTOXICATION OR OVERDOSE
In this case consult the Toxicological Information service or consult your doctor.

PRESENTATION
Packages containing 20 and 60 capsules.

OTHER PRESENTATIONS
VENOSMIL gel, 60 g tube.

STORAGE OF VENOSMIL
Store below 25°C.
Expiry
This drug should not be used after the expiry date on the package.

KEEP VENOSMIL OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN
Prescription drug.