INPHA-Médis
Industrie Pharmaceutique

ATOR
Atrovastatine
10 mg
20 mg
40 mg
80 mg

1. QU'EST-CE QUE ATOR 10 - 20 - 40 - 80 mg?

Forme pharmaceutique

ATOR 10 mg se présente sous forme de comprimés pelliculés sécables.
ATOR 20 mg se présente sous forme de comprimés pelliculés

ATOR 40 mg se présente sous forme de comprimés pelliculés sécables.
ATOR 80 mg se présente sous forme de comprimés pelliculés .

Classe pharmacothérapeutique

L'Atorvastatine est un hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant, inhibiteur de l'hmg_coa réductase.

Composition

Chaque Comprimé contient :

	ATOR 10 mg	ATOR 20 mg	ATOR 40 mg	ATOR 80 mg
Atorvastatine (sous forme calcique trihydratée)	10 mg (10,85 mg)	20 mg (21,70 mg)	40 mg (43,38 mg)	80 mg (86.76 mg)
Excipients : Hydrogénophosphate de calcium anhydre, Lactose, Cellulose microcristalline, Croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, Opadry. Liste des excipients à effet notoire : Lactose				

2. DANS QUELS CAS UTILISER ATOR 10 - 20 - 40 - 80 mg?

- Réduction des hypercholestérolémies pures (type IIa) ou mixtes (type IIb et III) en complément d'un régime adapté et assidu.
- Hypercholestérolémie familiale homozygote, en addition à d'autres traitements hypolipémiants.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE ATOR 10 mg - ATOR 20 mg - ATOR 40 mg - ATOR 80 mg?

Contre indications

ATOR ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Allergie à l'un des constituants
- Maladies hépatiques
- Grossesse et allaitement
- En cas d'association à l'itraconazole, kétoconazole (médicaments traitant certaines infections à champignons), au stiripentol (traitement de l'épilepsie , à la delavirdine (traitement d'une infection par le VIH) et à la télithromycine.
- Sauf avis contraire de votre médecin, en cas d'association aux fibrates (autres médicaments pour abaisser le cholestérol).

Mise en garde et précautions d'emploi

*** Mise en garde**
- Dans le traitement des hypercholestérolémies, le respect scrupuleux du régime alimentaire prescrit par le médecin est indispensable.
- Un bilan hépatique sera effectué avant le traitement et régulièrement sous traitement.
- En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin traitant.
- En raison de la présence du lactose, ATOR est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

*** Précautions d'emploi**

Utiliser ATOR avec précaution dans les cas suivants :
- Si vous consommez d'importantes quantités d'alcool ou si vous avez eu une maladie hépatique,
- La consommation du jus de pamplemousse doit être évitée.
- En cas de désir de grossesse ou si vous souhaitez allaiter votre enfant.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

*** Grossesse**

ATOR n'a pas d'indication pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

*** Allaitement**

ATOR passe dans le lait maternel. En conséquence, il convient de ne pas l'utiliser si vous désirez allaiter.

Interactions avec d'autres médicaments

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
Il est particulièrement important que votre médecin sache si vous prenez un fibrate.

4*COMMENT PRENDRE ATOR 10mg - ATOR 20mg - ATOR 40mg - ATOR 80mg?

***POSOLOGIE**

La posologie usuelle est de 10mg voire 20mg par jour. Si nécessaire, la posologie peut être augmentée jusqu'à 80 mg par jour au maximum. Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

***MODE D 'ADMINISTRATION**

VOIE ORALE. Les comprimés doivent être avalée avec un peu d 'eau.
A prendre en une seule fois (indifféremment avant, pendant ou après le repas)
En association avec le régime, **ATOR** constitue un traitement devant être prolongé et régulièrement surveillé.
Pour une bonne utilisation de **ATOR**, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière, qui comporte des contrôles sanguins réguliers du cholestérol.
Les enzymes du foie (transaminases) seront aussi surveillés régulièrement.
Dans tous les cas se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

5. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tout produit actif, **ATOR** peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :
- Pour la plupart, les effets signalés ont été légers et de courte durée: troubles digestifs (constipation, ballonnement abdominal, douleurs abdominales, nausées, diarrhée), céphalées (maux de tête), fatigue, insomnie, manifestations allergiques.
- Des douleurs ou crampes musculaires (avec parfois augmentation des enzymes musculaires) ont été rapportées

Si vous ressentez des douleurs musculaires, une sensibilité musculaire douloureuse ou une faiblesse musculaire, contactez immédiatement votre médecin car les problèmes musculaires peuvent être graves dans de rares cas.
- Certaines anomalies biologiques ont été observés : élévation de certaines enzymes du foie (ASAT, ALAT) ; élévation de certaines enzymes musculaires (CPK) ; élévation ou diminution de la glycémie; diminution des plaquettes (thrombopénie).
- Ont été également observés :
- Troubles cutanés (démangeaisons, éruption étendue), chute des cheveux ou des poils,
- Signes neurologiques : fourmillements, neuropathie périphérique (atteinte des nerfs des membres), sensation vertigineuse, troubles de la mémoire,
- Perte d'appétit et vomissement, oedèmes périphériques, impuissance et douleurs articulaires.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice

6. COMMENT CONSERVER ATOR 10mg - ATOR 20mg - ATOR 40mg - ATOR 80mg?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

7. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ?

Liste I – uniquement sur ordonnance médicale.

8. PRÉSENTATION ET NUMÉRO DE DÉCISION D'ENREGISTREMENT

Spécialité	Présentation	N° D. E.
ATOR 10 mg	Boîte de 28 Comprimés	10 / 06 M198 / 317
ATOR 20 mg	Boîte de 28 Comprimés	11 / 06 M225 / 317
ATOR 40 mg	Boîte de 28 Comprimés	11 / 06 M232 / 317
ATOR 80 mg	Boîte de 28 Comprimés	12 / 06 M 233 /317

CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

Fabricant et Titulaire de la D.E
Les laboratoires INPHA-Médis
Siège sociale : 08,Rue Prosper Dubourg,Annaba-Algérie
Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44,Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.