ASIATICOSID

Poudre à 2% et onguent à 1%

Extrait de CENTELLA ASIATICA

FORME, PRESENTATION ET COMPOSITION :

Poudre à 2%-flacon de 2 g : *Pour 100 g de poudre* : *Principe actif* : Asiaticoside (triterpènes de la Centella Asiatica) 2 g

Excipients : Magnésium stéarate, talc, q.s

Onguent à 1%-tube de 10 g : *Pour 100 g d'onguent* :

Principe actif : Asiaticoside (triterpènes de la Centella Asiatica) 1g

Excipients : Glycérilmonostéarate, huile de germe de grain, α tocophérol acétate, alcool cétylstéarilique, parahydroxybenzoates de méthyle et de propyle, propylèneglycol, essences de géranium et de lavande déterpénées, eau purifiée q.s.

Excipients à effets notoire : parahydroxybenzoates de méthyle et de propyle, propylèneglycol.

PROPRIETES :

La fraction totale Triterpénique de Centella Asiatica exerce un effet marqué de modulation sur le développement du tissu connectif par une action directe aussi bien sur les fibroblastes que sur les deux acides aminés fondamentaux dans le métabolisme du collagène, la proline et l'alanine. On obtient ainsi une stimulation des processus de cicatrisation, une réépitélisation améliorée ainsi qu'une normalisation du tissu connectif périvasculaire. Tout ceci se reflète dans une réduction de la perméabilisation de l'endothélium vasculaire et dans un rétablissement de l'équilibre hémodynamique du système microvasculaire.

L'Asiaticoside est dépourvue de toxicité, aussi bien chez l'adulte que chez les fœtus, et elle est bien tolérée dans les traitements par voie épicutanée.

INDICATIONS :

Dans le traitement topique de l'ulcère variqueuse, des escarres, des brûlures d'origine différente ; dans les retards de cicatrisation.

CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité vérifiée aux principes actifs du médicament.

PRECAUTIONS :

Au cas où il y aurait des lésions, il faudra associer une thérapie antibactérienne.

L'administration de l'Asiaticoside est déconseillée pendant le premier trimestre de grossesse, pendant les mois successifs sous prescription médicale directe.

Formes non adaptées à l'usage ophtalmique.

Eviter l'utilisation de l'onguent sur des lésions qui ont tendance à macérer.

La poudre est particulièrement réservée aux lésions suintantes ; ne pas utiliser la poudre sur des plaies profondes.

INTERACTIONS PHARMACOLOGIQUES :

On ne connaît aucune interaction avec d'autres médicaments

EFFETS COLLATERAUX :

Aucun effet collatéral n'a été signalé. Parfois après traitements prolongés, il peut se manifester une sensibilisation locale, telles que pruris, sensation de brûlures et éruption eczématiforme; dans ce cas, le traitement doit être interrompu il faudra instaurer une thérapie substitutive.

POSOLOGIE :

Application de poudre ou d'onguent selon les besoins, en général 1 ou 2 fois par jour.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer la poudre et l'onguent sur les lésions après désinfection et suivant le rythme des pansements.

SURDOSAGE :

Aucun cas de surdosage n'a été communiqué.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qui il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

N° Enregistrement : 013/07A 001/96/10 Poudre à 2%
013/07A 002/98 Onguent à 1%

Fabricant et détenteur de la D.E.:
Industria Farmaceutica **NOVA ARGENTIA S.p.A.** - Via Pascoli, 1 - Gorgonzola (MI) - Italie

IDG 04/16

C2-F05683510/04