

# Eclaran 5/10

Peroxyde de Benzoyle - GEL POUR APPLICATION LOCALE

**1 - IDENTIFICATION DU MEDICAMENT.** **Dénomination :** Eclaran 5, gel pour application locale. **Composition qualitative et quantitative :** Peroxyde de Benzoyle 5,0 g. Excipients : Huile de ricin hydrogénée et éthoxylée (Crémophor RH 40), huile de silicone, polymère carboxyvinyle, hydroxyde de sodium, eau purifiée q.s.p. 100 g. **Dénomination :** Eclaran 10, gel pour application locale. **Composition qualitative et quantitative :** Peroxyde de Benzoyle 10,0 g. Excipients : Huile de ricin hydrogénée et éthoxylée (Crémophor RH 40), huile de silicone, polymère carboxyvinyle, hydroxyde de sodium, eau purifiée q.s.p. 100 g. **Forme pharmaceutique :** Gel pour application locale en tube de 45 g. **Classe pharmaco-thérapeutique :** PREPARATION ANTIACNEIQUE A USAGE LOCAL (Dermatologie). **Nom et adresse de l'exploitant :** Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie, 45, place Abel-Gance 92100 Boulogne - France. **Nom et Adresse du fabricant :** PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, Etablissement Progipharm, Rue du lycée, 45502 Gien cedex - France.

**2 - DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques) :** Acné Vulgaire.

**3 - ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (Contre-indications) :** Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants : chez les malades sensibles aux peroxydes (eau oxygénée...). EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **Mises en garde spéciales :** • Ne pas avaler • Eviter d'appliquer le produit sur une plaie ou une lésion cutanée préalable • Décoloration de certaines fibres textiles (vêtements, literie...) **Précautions d'emploi :** • Lors des premières applications, il convient, pour tester la sensibilité individuelle, d'effectuer un essai répété sur une surface cutanée réduite (touche d'essai) • Sauf indications précises, l'emploi simultané d'autres thérapeutiques locales kératolytiques (qui dissolvent la couche cornée de la peau) ou détersives est déconseillé. • Si les phénomènes irritatifs s'avèrent importants ou mal tolérés, espacer les applications. Si l'irritation gênante persiste malgré les précautions d'emploi, le traitement devra être interrompu • En cas d'application accidentelle sur les muqueuses (yeux, bouche, narines) ou sur les paupières, rincer très soigneusement à l'eau • Ne pas appliquer sur une peau déjà irritée par des traitements préalables • Eviter les expositions solaires en début de traitement : par la suite, une photoprotection est recommandée. Si une exposition préalable a entraîné des brûlures (coups de soleil), attendre la disparition des signes avant d'entreprendre le traitement • Ne pas utiliser de lampes à ultraviolets • Une prudence particulière s'impose chez les sujets au teint clair et lors de l'application sur les zones fragiles : cou, décolleté, pourtour des yeux et de la bouche. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **Interactions médicamenteuses et autres interactions :** AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN. **Grossesse - Allaitement :** D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT.

**4 - COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT. Posologie :** En général, 1 à 2 applications par jour sur les lésions. En cure d'entretien : 1 application tous les 2 ou 3 jours. **DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.** **Mode et voie d'administration :** Voie cutanée. Se laver les mains après emploi. **DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.** **Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :** 1 à 2 applications par jour.

**5 - EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (Effets indésirables) :** COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINDER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : Certaines réactions locales du type rougeur, desquamation de la peau (peau qui « pèle »), sécheresse, sensation de cuisson, peuvent apparaître au cours du traitement. Dans ce cas, la posologie doit être réduite selon avis médical. **SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE. NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**6 - CONSERVATION :** Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur. **Précautions particulières de conservation :** Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25° C, éviter la proximité d'une flamme. Médicament autorisé en France n°326 786-7 (Eclaran 5), n°326 252-2 (Eclaran 10). Médicament uniquement sur ordonnance. Liste II.