Locacid

CRÈME DERMATOLOGIQUE À 0,05 % DE TRÉTINOÏNE - LOTION A 0,1 % DE TRÉTINOÏNE - USAGE EXTERNE

1 - IDENTIFICATION DU MEDICAMENT. Dénomination : LOCACID, crème. **Composition qualitative et quantitative :** Trétinoïne 0,05 g. Excipients : alcool éthylique à 96 %, polyoxyéthylène glycol 600, acétate d'α tocophérol, butylhydroxytoluène, butylhydroxyanisole, huile de vaseline épaisse, huile de ricin hydrogénée et éthoxylée, polymère carboxyvinylique, acide sorbique, parahydroxybenzoate de méthyle, parfum, triéthanolamine, eau potable q.s.p. 100 g. **Forme pharmaceutique :** Crème tube de 30 g.

Dénomination : LOCACID, lotion. **Composition qualitative et quantitative :** Trétinoïne 0,10 g. Excipients : butylhydroxytoluène, alcool éthylique à 95 %, polyoxyéthylène glycol 400, q.s.p. 100 ml. **Forme pharmaceutique :** Lotion flacon de 15 ml.

Classe pharmaco-thérapeutique : PREPARATION ANTIACNEIQUE A USAGE LOCAL (Dermatologie). **Nom et adresse de l'exploitant :** Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie. 45, place Abel-Gance 92100 Boulogne - France. **Nom et adresse du fabricant :** PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION. Etablissement Progipharm. Rue du Lycée, 45502 Gien cedex - France et/ou Etablissement Simaphac. Z.I., 45220 Chateaurenard - France. **2 - DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques) :** Les différentes formes cliniques d'acné (à l'exception de l'acné rosacée), maladie de Favre et Racouchot. **3 - ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (Contre-indications) :** EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **Precautions d'emploi :** • Il est souhaitable que, lors des premières applications, un essai soit effectué sur une surface cutanée réduite (touche d'essai) • Eviter le contact avec les yeux, la bouche, les narines et les muqueuses. Si tel était le cas, il est recommandé d'effectuer un lavage soigneux à l'eau • Une prudence particulière s'impose lors d'un traitement simultané avec d'autres préparations, surtout avec celles présentant un pouvoir desquamant. Si avant le traitement par ce médicament, le patient a déjà été traité avec des préparations exfoliantes, il est recommandé d'attendre la guérison des lésions cutanées • Les expositions aux radiations du soleil et les lampes à ultra-violets provoquent une irritation supplémentaire ; il y a donc lieu de les éviter. En présence d'érythème solaire (coup de soleil), attendre la disparition des signes avant d'entreprendre le traitement • Eviter d'utiliser conjointement tout produit parfumé ou alcoolisé qui pourrait intensifier les phénomènes irritatifs • S'abstenir de lavages trop fréquents, deux fois par jour suffisent. Sécher sans frotter. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **Interactions médicamenteuses et autres interactions :** AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN. **Grossesse - Allaitement :** Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse. D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse ou de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament. **Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :** - Butylhydroxyanisole (B.H.A.) (crème) - Butylhydroxytoluène (B.H.T.) (crème et lotion) - Parahydroxybenzoate de méthyle (crème). **4 - COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT. Posologie :** En général, une application quotidienne, de préférence le soir, une demi-heure avant le coucher, sur une peau parfaitement sèche (15 minutes après une toilette douce à l'aide d'un lait ou d'un pain dermatologique). DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN. **Mode et voie d'administration :** Voie cutanée. Ne pas avaler • Crème : Etendre une quantité de crème correspondant à un pois sur les lésions à traiter et masser légèrement jusqu'à pénétration complète • Lotion : Appliquer la solution du bout des doigts, quelques gouttes ayant été déposées dans le creux de la main. Se laver les mains après emploi. DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN. **5 - EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (Effets indésirables) :** COMME TOUT PRODUIT ACTIF CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS. Des effets secondaires locaux apparaissent au cours des premières semaines de traitement sous forme de phénomènes irritatifs caractérisés par une rougeur de la peau, légèrement cuisante, siégeant surtout autour de la bouche et du cou, une sensation de picotement, de sécheresse de la peau, une légère desquamation (peau qui pèle). Variables en intensité, généralement transitaires, ces réactions sont normales tant qu'elles restent modérées, dans les limites de la tolérance individuelle et susceptibles de céder à une simple réduction de posologie. On constate une exacerbation, également passagère, de l'acné. Cette réaction est normale, il s'agit de l'élimination accélérée des microkystes qui étaient en formation dans la profondeur de la peau. En raison de la présence de butylhydroxyanisole (crème uniquement) et de butylhydroxytoluène (crème et lotion), ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses. En raison de la présence de parabène (parahydroxybenzoate), ce médicament peut provoquer de l'urticaire (ne concerne que la crème). EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE. **6 - CONSERVATION : Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur. Précautions particulières de conservation :** Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25° C. Médicament autorisé en France n°323 730-0 (Lotion), n° 323 729-2 (Crème). Médicament uniquement sur ordonnance, non renouvelable sans avis médical. Liste I.