MYCOCIDE®

0,1% - 0,25% - 10MUI

Triamcinolone - Néomycine - Nystatine

Forme et présentation :
Pommade : Tube de 15g.
Composition :
Triamcinolone (DCI) acétonide 0,1g
Néomycine (DCI) sulfate exprimée en base .....0,25 g
Nystatine (DCI) ..... 10 MUI
Excipients :.....qsp 100g
Classe pharmaco-thérapeutique :
Dermocorticoïde, antibiotique et antifongique.
Indications thérapeutiques:
Cette pommade est utilisée dans les 8 premiers jours du traitement des maladies de la peau dues à certains champignons lorsqu'il existe une inflammation locale et une surinfection .
Contre-indications :
Ce médicament **ne doit pas être utilisé** dans les cas suivants :
- Allergies aux antifongiques de la famille des imidazolés ;
- Infection virale ou bactérienne de la peau, notamment varicelle, herpès, zona, impétigo ;
- Plaie chroniques, ulcère de la jambe, escarre ;
- Acné ou rosacée ;
- En application sur les paupières ;
- En application sur le mamelon chez la femme qui allaite .

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Mise en garde :
Utiliser ce médicament avec précaution :
En raison du passage du corticoïde dans la circulation générale, un traitement sur de grandes surfaces ou sous occlusion peut entraîner les effets systémiques d'une corticothérapie générale, particulièrement chez le nourrisson et l'enfants en bas âge.
L'utilisation prolongée sur le visage des corticoïdes d'activité très forte, expose à la survenue d'une dermite cortico-sensible, avec rebond après chaque arrêt.
Un sevrage progressif est alors nécessaire.
Précaution d'emploi:
Ne pas utiliser pour traiter les lésions suintantes ou les plis (phénomène occlusif surtout chez le nourrisson)
En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien .
Grossesse et allaitement :
L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.
L'application sur le mamelon est contre-indiquée chez la femme qui allaite.
Posologie et mode d'administration :
Posologie usuelle:
1 à 2 applications par jour, pendant 8 jours au maximum.
Etaler la pommade sur les lésions et la faire pénétrer par un léger massage .
Conseil :
En cas de candidose, évitez d'utiliser les savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.
Pensez à vous laver les mains après application .
Effets indésirables :
Compte tenu de la brièveté du traitement, il sont peu fréquents :
- Dilatation des petits vaisseaux, vergetures, éruptions de boutons;
- Développement anormal des poils, dessèchement, fragilisation et décoloration irrégulière de la peau;
- Rougeur autour de la bouche, apparition d'une rosacée ;
- Retard de cicatrisation ;
- Allergie cutanée (néomycine).

Signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
Conservation :
A conserver en dessous de 25° C
Date de révision de la notice : Octobre 2008
Liste I (Tableu A)
DE :09/97/07 C 020/003

NE JAMAIS LAISSER LES MÉDICAMENTS A LA PORTÉE DES ENFANTS

Fabricant et Détenteur de la DE

Groupe SAIDAL - BIOTIC - Usine El-Harrach - Algerie

ICPC Boufrioua