MYCOMAZOLE®

Dérivé Imidazolé doué d´une activité antifongique et antibactérienne.

Mécanisme d'Action

Action simultanée sur 3 niveaux :

➤ Membranaire :

Augmentation de la perméabilité.

➤ Cytoplasmique :

Inhibition des processus oxydatifs au niveau des mitochondries.

➤ Nucléaire :

Inhibition de la synthèse de l´ARN.

INDICATIONS

• Candidoses :

Traitement :
- Intertrigos, en particulier génitocruraux, anaux et perianaux.
- Perlèche.
- D´appoint des onyxis et périonyxis.

Durée du traitement 3 à 4 semaines.

- Vulvite, balanite.

Durée du traitement 1 à 2 semaines.

• Dermatophyties :

Traitement :
- Dermatophyties de la peau glabre.
- Intertrigos génitaux et cruraux.
- Intertrigos des orteils (pied d´athlète).
- Sycosis et kérions.

Durée du traitement 3 à 4 semaines.

Traitement d'appoint :
- Teignes.
- Folliculites à Trichophyton rubrum.

Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire.

• Pityriasis Versicolor

Durée du traitement 1 à 3 semaines.

• Erythrasma

Durée du traitement 2 à 4 semaines.