OROFER

Hydroxyde ferrique polymaltose 50mg/5ml
Flacon de 100ml

1. QU'EST-CE QUE OROFER?

Forme pharmaceutique

OROFER se présente sous forme de solution buvable.

Classe pharmaco thérapeutique

Anti-anémique (hydroxyde de poly maltose de fer III).

Composition

Chaque 5 ml contient :

Hydroxyde ferrique poly maltose équivalent à 50 mg de fer élémentaire

Excipients :saccharose, sorbitol 70%, hydroxybenzoate de méthyl, hydroxybenzoate de propyl, arôme .
eau purifiée……Q.S.P. 100 ml

2. DANS QUELS CAS UTILISER OROFER ?

Traitement des carences en fer latentes.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE OROFER?

Contre indications

- surcharge martiale en particulier anémie nor hypersidérémique telle que thalassémie, anémie réfractaire, anémie par insuffisance médullaire
- hypersensibilité à l'un des constituants.

Mise en garde et précautions d'emploi

- L'hyposidérémie associée aux syndromes inflammatoires n'est pas sensible au traitement martial.
- Le traitement martial doit, dans la mesure du possible, être associé au traitement étiologique.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

*** Grossesse**

Des données cliniques négatives portant sur quelques milliers de femmes traitées, semblent exclure un effet néfaste de l'hydroxyde ferrique.
En conséquence, ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrit pendant la grossesse.

*** Allaitement**

Le passage de l'hydroxyde ferrique dans le lait maternel n'a pas été évalué, mais compte tenu de la nature de cette molécule, l'administration de ce médicament est possible chez la femme allaitante.

Interactions avec d'autres médicaments

Il n'y a pas d'interactions ioniques avec les composants contenus dans la nourriture ni avec les médicaments (tétracycline et anti-acides).

4. COMMENT PRENDRE OROFER?

Posologie et mode d'administration

*** Posologie**

Adultes : 5 ml, 2 à 3 fois par jour
Enfants : 5 ml, 1 à 2 fois par jour

Nourrissons : débuter avec 2,5 ml, 1 fois ou 2 fois par jour tenant compte de l'amélioration clinique du patient ; augmenter la dose à 5 ml une fois ou 2 fois par jour.

*** Mode d'administration**

voie orale: La solution est prise pendant ou après les repas

Surdosage

Bien qu'on n'ait signalé aucune intoxication due au surdosage du OROFER, l'utilisation de la déféroxamine ou calcium di sodium EDTA est conseillée.

5. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

En raison de la particularité du fer non ionisé, les effets indésirables tels que : irritations gastro-intestinales, nausées, diarrhée et constipation propre aux préparations à base de fer ionisé, sont très rares avec la solution buvable OROFER.

6. COMMENT CONSERVER OROFER?

A conserver à une température inférieure 30C

7. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE ?

Sous ordonnance médicale

8. PRESENTATION ET NUMERO D.E. :

Spécialité	Présentation	N° D.E.
OROFER	Flacon de 100 ml	DE: 09 / 12E 109 / 317

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

Fabricant et Titulaire de la D.E
Les laboratoires INPHA-Médis
Siège sociale : 08,Rue Prosper Dubourg,Annaba-Algérie
Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44,Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.