ZANITRA PLUS®

Sulfate ferreux anhydre / Acide folique

Forme Pharmaceutique et présentation :
Gélule (en gélatine dure de couleur rouge opaque/blanc transparent contenant des pellets rouge marrons, jaunes et blanches) : boîte de 30 .

Classe pharmco-thérapeutique :
Préparation antianémique / vitamines .

Composition :
Sulfate ferreux anhydre .....150mg (soit Fe++ 49,297 mg).
Acide folique .....0,5 mg .
Excipients .....q.s.p 1 gélule .

Excipient à effet notoire : Saccharose .

Indication thérapeutique :
Zanitra plus® est indiqué pendant la grossesse pour prévenir des carences en fer et en acide folique lorsque l'alimentation ne permet pas d'apporter une quantité suffisante de ces éléments .

Contre-indications :
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans le cas :
- D'une surcharge en fer ;
- D'hypersensibilité à l'un des composants du **Zanitra plus®**.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN .

Posologie :
Une gélule par jour pendant les deux derniers mois de la grossesse .

Mode d'administration :
La gélule doits être avalée avec un verre d'eau, de préférence en dehors des repas .

Durée du traitement :
Respecter impérativement la durée du traitement prescrite .

Effets indésirables :
Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements et la coloration des selles en noir .

SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE .

Mises en garde et précaution d'emploi :
La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson .

Interactions médicamenteuses et autres interactions :
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments notamment les sels de fer par voie injectable, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien .

Conditions particulières de conservation :
Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25° C et à l'abri de l'humidité .

VOTRE MÉDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES MÉDICAMENTS, N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRÉCISIONS .

Détenteur et numéro de la DE :

GROUPE SAIDAL - Société par action
Route de la wilaya N°11 BP 141 Dar El-Beida Alger - ALGÉRIE

N° DE : 07/12E 125/003
Date de révision : Mai 2012

Nom et adresse du fabricant :
Usine Gué de Constantine - Route de Baraki
BP 67 KOUBA 16 231 - ALGER - ALGÉRIE .

NE PAS LAISSER LES MÉDICAMENTS A LA PORTÉE DES ENFANTS

SNC .ICPC - Boufrioua 2015