SAIPRIL PLUS® 50/25 mg

Captopril-Hydrochlorothiazide

Présentation:
Boîte de 30 Comprimés sécables.

Classe pharmaceutique:
Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine associé à un diurétique du segment cortical de dilution

Composition :
Captopril ..... 50 mg
Hydrochlorothiazide ..... 25 mg
Excipients .....q.s.p 1 comprimé
Excipients à effets notoires : Lactose, jaune orangé S(E110).

Indications :
Ce médicament contient deux principes actifs antihypertenseurs , à des effets diurétiques et vasculaires. Il est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.

Contre-indications:
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:
- Allergie à ce médicament, y compris à type d'oedèmes importants de la face.
- Grossesse et allaitement.

En cas de doute , il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi:
Prévenir votre médecin en cas de :
- Insuffisance rénale ou cardiaque , diabète , athérosclérose, sténose de l'artère rénale.
- Hypotension ou suivi d'un régime strictement sans sel.
- En cas d'intervention chirurgicale , prévenir l'anesthésiste de la prise de ce médicament.
- Ce médicament contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde spéciales:
- Si une toux sèche se produit lors de la prise de ce médicament, il est impératif de consulter à nouveau le médecin qui jugera de l'opportunité de poursuivre le traitement
- Risque de réactions allergiques et d'oedème de la face.
- Prévenir votre médecin si vous devez être hémodialysé.

Interactions médicamenteuses:
Afin d'éviter d'éventuelle interactions entre plusieurs médicaments , il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien, et notamment le lithium, les sels de potassium ou un diurétique hyperkaliémiant, l'astémizole, le bépridil, l'érythromycine par voie intraveineuse, l'halofantrine, la pentamidine , le sultropide, la terfénadine, la vincamine.

Grossesse :
La découverte d'une grossesse , nécessite absolument l'arrêt du traitement.

Posologie et mode d'administration:
Posologie:
La posologie doit être établie par le médecin.
La dose usuelle est de 1 comprimé par jour .

Mode et voie d'administration:
Ce médicament doit être administré par voie orale et en une prise matinale.

Effets non souhaités et gênants:
Eruptions cutanées, toux, étourdissement, fatigue troubles digestifs.
Signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Conservation :
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation mentionnée sur le conditionnement extérieur. Ce médicament doit être conservé à l'abri de la lumière.

Condition de délivrance :
Ce médicament est inscrit sur la liste I.

Uniquement sur ordonnance

DE : 06/06 E 137/003

NE JAMAIS LAISSER LES MÉDICAMENTS A LA PORTÉE DES ENFANTS

Fabricant et détenteur de DE

Groupe SAIDAL - Biotic - Usine El-Harrach Algerie

ICPC Boufarik