NASACORT®

55 µg par dose

Acétonide de triamcinolone

Suspension pour pulvérisation nasale

Aventis

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Acétonide de triamcinolone .....

55 microgrammes pour une dose.

Excipients : édétate disodique, glucose anhydre, cellulose microcristalline et carmellose sodique (AVICEL CL 611), polysorbate 80, chlorure de benzalkonium, acide chlorhydrique dilué, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Un flacon correspond à 120 pulvérisations. Une pulvérisation de 100 milligrammes correspond à une dose de 55 microgrammes d'acétonide de triamcinolone.

FORME PHARMACEUTIQUE : Suspension pour pulvérisation nasale.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

GLUCOCORTICOÏDE PAR VOIE LOCALE (R : Système respiratoire)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoire Aventis - 46, Quai de la Rapée - 75601 Paris Cedex 12

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Aventis Pharma - 72, London Road - Holmes Chapel - Crewe - Cheshire CW4 8 BE - Royaume-Uni

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT (INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)

Ce médicament contient un corticoïde. C'est un traitement antiinflammatoire qui s'administre par voie nasale.

C'est un médicament anti-inflammatoire indiqué :

- chez l'adulte : en traitement de la rhinite allergique (saisonnière et perannuelle),
- chez l'enfant de plus de 6 ans : en traitement de la rhinite allergique saisonnière uniquement (rhume des foins).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des composants,
- si vous saignez du nez,
- en cas d'herpès nasal, buccal ou oculaire,
- chez l'enfant de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de surinfection (mouchage purulent), de fièvre ou d'infection broncho-pulmonaire concomitante, **prévenir votre médecin.**

Ce produit n'est pas recommandé chez les patients ayant subi récemment une intervention chirurgicale ou un traumatisme au niveau du nez, tant que la guérison n'est pas complète.

Chez l'enfant de plus de 6 ans, l'utilisation ne doit pas dépasser 3 mois.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament est un traitement régulier. Son efficacité sur les symptômes peut n'apparaître que plusieurs jours après le début du traitement.

Pour que ce médicament soit actif, les fosses nasales doivent être libres. Il convient par conséquent de se moucher avant l'instillation du produit.

Si l'obstruction nasale (sensation de nez bouché) persiste malgré la mise en route du traitement, consultez votre médecin afin qu'il réévalue le traitement.

En cas de traitement prolongé, un examen ORL détaillé de la muqueuse nasale doit être réalisé régulièrement.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne peut être utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger du traitement le mieux adapté à votre cas.

Ce médicament peut être administré en cure courte pendant l'allaitement.

En cas de traitement prolongé, il est préférable d'éviter l'allaitement pendant ce traitement.

D'UNE FACON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

SPORTIFS

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles antidopages.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Chlorure de benzalkonium.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

Adulte : 220 µg par jour, soit 2 pulvérisations dans chaque narine 1 fois par jour le matin. La posologie peut être diminuée à 110 µg par jour, soit 1 pulvérisation dans chaque narine une fois l'amélioration des symptômes obtenue.

Enfant de plus de 6 ans en traitement de la rhinite allergique saisonnière uniquement : 110 µg par jour soit 1 pulvérisation dans chaque narine 1 fois par jour le matin.

Chez l'enfant, la durée du traitement sera limitée à 3 mois maximum en l'absence de données suffisantes de tolérance au-delà de cette durée de traitement.

La mise en route et la durée du traitement sont fonction de l'exposition à l'allergène.

En cas de persistance des troubles, ne pas augmenter la dose, mais consulter votre médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie nasale. (Voir schémas ci-dessous)

FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Ce médicament doit être administré une fois par jour le matin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

DURÉE DU TRAITEMENT : *DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.*

CONDUITE À TENIR AU CAS OÙ L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ÉTÉ OMISE

Si vous avez oublié de prendre ce médicament, ne faites pas de pulvérisations supplémentaires mais poursuivez votre traitement normalement.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS.

Possibilité de saignements de nez, de maux de tête, d'irritation de la gorge, d'irritation ou de sensation de brûlure nasale, éternuements, de sécheresse de la muqueuse du nez.

Une candidose nasale peut parfois apparaître, il conviendra alors d'interrompre le traitement et d'envisager un traitement adapté. Consultez votre médecin afin qu'il envisage avec vous un traitement adapté. Dans ce cas, il est préférable d'interrompre le traitement corticoïde jusqu'à guérison de la candidose.

En cas de persistance des symptômes ou d'apparition de nouveaux symptômes, consultez votre médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN.

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Février 2001.

1) Lors du premier usage, la pompe doit être amorcée par 5 pulvérisations. Inutilisée, celle-ci reste correctement amorcée pendant environ 2 semaines. Au-delà, elle peut être réamorcée par 1 seule pulvérisation.

2) Se moucher avant la prise.

3) Retirer le capuchon protecteur et la bague bleue du flacon.

4) Agiter légèrement le flacon avant emploi.

5) Lors du premier usage, la pompe doit être amorcée par 5 pulvérisations. Inutilisée, celle-ci reste correctement amorcée pendant environ 2 semaines. Au-delà, elle peut être réamorcée par une seule pulvérisation.

6) Boucher une narine. Insérer l'applicateur nasal dans l'autre narine, le flacon étant toujours en position verticale.
Appuyer 1 ou 2 fois selon la posologie de haut en bas sur la collerette pour libérer 1 ou 2 pulvérisations en inspirant par cette narine.
Répéter cette opération pour l'autre narine.

7) Essuyer l'applicateur nasal. Remettre le capuchon protecteur et la bague bleue sur le flacon.