Totinal® 1 mg
Kétotifène fumarate

ACTION
Totinal est un agent prophylactique de l'asthme, à propriétés antianaphylactiques marquées, effet antihistaminique spécifique et non bronchodilatateur. Le Totinal est bien absorbé après administration par voie orale. Son action est prolongée jusqu'à 12 heures.
Le début de son activité prophylactique est lent; 4 à 6 semaines sont nécessaires pour obtenir un effet prophylactique maximal.

COMPOSITION
Comprimés

p Cp
Kétotifène (fumarate)..... 1 mg
Excipients : Amidon de maïs, Lactose, Stéarate de magnésium, Dioxyde de silicone colloïdale.
Excipinets à effets notoires, Lactose.
DE: TOTINAL 1MG COMPRIMÉS 09/96/20A012/001

Sirop

p dose (5ml)
Kétotifène (fumarate).....1 mg
Excipients : Benzoate de Sodium , Sorbitol, Méthyl Parabène, Propyl Parabène, Arome tutti frutti liquide, Saccharose, Glycérine, Acide Citrique, Phosphate d'hydrogène disodique, eau purifiée.
Excipinets à effets notoires: Saccharose, Glycérine, Sodium, Sorbitol.
DE: TOTINAL SIROP 06/97/20A013/001

INDICATIONS
Totinal est indiqué dans:
- Prévention à long terme de l'asthme bronchique, bronchite allergique et symptômes asthmatiques associés au rhume des foins.
- Prévention et traitement des manifestations systémiques allergiques, rhinites allergiques et réactions cutanées allergiques.

Totinal ne traite pas les symptômes de la crise d'asthme aiguë installée.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Il est conseillé de prendre le comprimé pendant le(s) repas.
Adultes et enfants de plus de 6 ans :
Un comprimé deux fois/jour. La dose peut être augmentée si nécessaire à deux comprimés deux fois/jour.
Pour les patients chez lesquels l'effet sédatif est prononcé, il est recommandé d'administrer un comprimé le soir au coucher pendant les premiers jours et d'augmenter ensuite la dose à un comprimé deux fois/jour dans les 5 jours qui suivent.

Enfants :
6 mois - 3 ans: 1/2 cuillerée à café (2,5 ml) deux fois /jour.
3 ans et plus: 1 cuillerée à café (5 ml) deux fois /jour.

CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilté connue au kétotifène ou à l'un des constituants.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Durant les premiers jours du traitement au Kétotifène, la vigilance des patients peut diminuer, les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines doivent faire attention.
Les autres médicaments de l'asthme, spécialement les corticostéroïdes et l'ACTH, ne doivent pas être arrêtés brutalement lors du début d'un traitement à long terme au Kétotifène.
La prise d'alcool est déconseillée pendant le traitement.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Le Kétotifène peut potentialiser les effets des sédatifs, des hypnotiques, des antihistaminiques et de l'alcool.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
La prescription du Kétotifène durant la grossesse doit être évitée même si l'effet tératogène n'est pas démontré. L'allaitement est déconseillé.

EFFETS INDESIRABLES
Sédation, sécheresse de la bouche et vertiges peuvent apparaître au début du traitement. Ceci pourrait nécessiter une diminution de dose ou un arrêt de traitement si l'intensité de ces effets ne diminue pas.
Prise de poids et céphalées ont aussi été rapportées.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Durant les premiers jours du traitement au Kétotifène, la vigilance des patients peut diminuer, les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines doivent faire attention.

CONDITIONS DE CONSERVATION
Comprimés : À conserver au sec entre 15 et 25°C.
Sirop : À conserver entre 15 et 25°C à l'abri de la lumière.

PRESCRIPTION
Liste II

Fabriqué et Conditionné par : HIKMA PHARMA ALGERIA
15, 16 Zone Industrielle Staouéli - ALGERIE
Pour HIKMA PHARMACEUTICALS
B.P.No. 182400 AMMAN 11118 - JORDANIE

CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament est un produit qui affecte la santé, son administration sans avis médical peut être dangereuse.
- Suivre strictement la prescription médicale et les instructions du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien connaissent le médicament, ses bienfaits et ses risques.
- Ne pas interrompre le traitement prescrit.
- Ne pas reprendre le traitement sans avis médical.

Tenir hors de la portée des enfants
2INFTTN-AF-11/2009

HIKMA
QUALITY