PS9736

BRICANYL® L.P. 5 mg

Sulfate de Terbutaline

Comprimé à libération prolongée

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée ?
3. COMMENT PRENDRE BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AGONISTES SELECTIFS BETA 2 RECEPTEURS PAR VOIE SYSTEMIQUE BRONCHODILATATEUR - ANTIASTHMATIQUE

Ce médicament contient un bêta-2 mimétique.

C'est un bronchodilatateur (il augmente le calibre des bronches) à action retardée et de longue durée qui s'administre par voie orale.

Il est préconisé en traitement de fond continu de l'asthme et de certaines maladies des bronches, en association avec un traitement anti-inflammatoire (corticoïde par voie inhalée). Le traitement anti-inflammatoire associé ne doit pas être interrompu sans avis médical, même en cas d'amélioration très nette des symptômes.

Ce médicament n'est pas le traitement de la crise d'asthme.

2. QUELLES SONT LES

Sportifs

Sportifs attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

3. COMMENT PRENDRE BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée ?

Posologie

La posologie habituelle chez l'adulte, comme chez l'enfant de plus de 5 ans (et de plus de 20 kg) est de un comprimé matin et soir.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être impérativement avalés au cours des repas avec un grand verre d'eau, sans être croqués ni préalablement divisés.

Fréquence d'administration

Les prises doivent être réparties à intervalles réguliers deux fois par jour (matin et soir).

Durée du traitement

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Ne pas interrompre brutalement le traitement sans demander l'avis de votre médecin.

Si vous avez pris plus de BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée que vous n'auriez dû:

Consulter le médecin.

En cas de surdosage sont majorés le risque de tachycardie et arythmie cardiaque, modifications tensionnelles, tremblements, sueurs, agitation, nausées, hypokaliémie.

Conduite à tenir : en cas d'intoxication massive

- évacuation gastrique
- surveillance en milieu hospitalier

Si vous oubliez de prendre BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée :

Prendre la dose suivante au moment habituel sans tenir compte de la prise omise.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Palpitations et augmentation du rythme cardiaque.
- Rougeurs.
- Sueurs.
- Crampes musculaires.
- Vertiges
- Tremblements des extrémités.
- Maux de tête.
- Eruption cutanée.
- Trouble du sommeil.
- Troubles du comportement

AVANT DE PRENDRE BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée ?

N'utilisez jamais BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée dans les cas suivants:

- allergie à l'un des constituants,
- enfant de moins de 5 ans et de moins de 20 kg.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée:

Mises en garde

Ce médicament correspond à un traitement continu et régulier de l'asthme, à raison de deux prises par jour.

En cas de survenue de crises d'asthme ou de gêne respiratoire, il faut utiliser un autre médicament bronchodilatateur par voie inhalée à action rapide et de courte durée, le soulagement habituellement obtenu doit être alors observé rapidement. En cas d'échec consulter immédiatement un médecin.

Si les doses quotidiennes habituellement efficaces de ce médicament deviennent insuffisantes (augmentation de la fréquence des crises ou des épisodes de gêne respiratoire), ne pas augmenter le nombre de prises, mais consulter rapidement votre médecin qui réévaluera votre traitement.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

Précautions d'emploi

Il convient d'informer votre médecin si vous êtes atteint : de maladie de la glande thyroïde, de maladie cardiovasculaire (notamment troubles du rythme cardiaque, angine de poitrine, hypertension artérielle), de diabète afin qu'il détermine les modalités de prescription et de surveillance les plus adaptées à votre cas.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, en particulier les antidiabétiques oraux et halothane.

Grossesse et allaitement

Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation peut être utilisé pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

- Troubles digestifs (nausées, vomissements).
- Diminution du taux sanguin de potassium ou augmentation de la glycémie.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A PREVENIR VOTRE MEDECIN.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée ?

La substance active est :

Sulfate de terbutaline ..... 5 mg

Pour un comprimé à libération prolongée.

Les autres composants sont :

Chlorure de polyvinyle, silice colloïdale anhydre, acide tartrique, éthylcellulose, alcool stéarylique.

Qu'est-ce que BRICANYL® L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à libération prolongée. Flacon de 60.

Détenteur de la Décision d'Enregistrement

AstraZeneca
1, place Renault
92844 Rueil-Malmaison Cedex
France

Fabricant, Conditionneur et Libérateur

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje Suède

Liste 1

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 22 novembre 2012 / Algérie Avril 2014.

Numéro de Décision d'Enregistrement en Algérie :

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

[BRILP5MG ANIIIB 1212.1]

©AstraZeneca 2004-2013
Marques déposées – Propriété de AstraZeneca.

AstraZeneca