Flixotide® 50 microgrammes

PROPIONATE DE FLUTICASONE

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination

Flixotide® 50 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé.

Composition qualitative et quantitative

Flixotide® 50 µg :

Propionate de fluticasone .....50 microgrammes

Gaz propulseur :

Norflurane (tétrafluoroéthane ou HFA 134a) ..... q.s.p. 1 dose

Forme pharmaceutique

Suspension pour inhalation en flacon pressurisé, flacon de 120 doses.

Classe pharmaco-thérapeutique

GLUCOCORTICOÏDE PAR VOIE INHALÉE
ANTI-ASTHMATIQUE

Nom et adresse de l'exploitant

Laboratoire GlaxoSmithKline
100, route de Versailles - 78163 Marly-le-Roi Cedex

Fabriqué par :

Glaxo Wellcome Production - Z.I. n°2 - 23, rue Lavoisier - 27091 Evreux Cedex 9 - France

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

- Ce médicament est un corticoïde qui s'administre par voie inhalée.
- C'est un médicament anti-inflammatoire préconisé en prises régulières pour le traitement de fond quotidien de l'asthme.

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical, même en cas d'amélioration très nette des symptômes.

Attention : ce médicament n'est pas un bronchodilatateur.
Il ne permet pas le traitement de la crise d'asthme.

- Il n'apporte pas de soulagement immédiat. Il est en particulier sans action sur la crise d'asthme déclarée.

Son efficacité ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours et dépend du respect rigoureux de la posologie (dose et nombre de prises) prescrite par votre médecin et adaptée à votre cas.

ATTENTION !

Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament ?

En cas de survenue de majoration de la gêne respiratoire à la suite de l'inhalation de ce produit, ne pas renouveler la prise de ce médicament, mais contacter votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN.

Mises en garde spéciales

En cas de survenue de crises ou de gêne respiratoire, il faut utiliser un autre médicament «bronchodilatateur bêta-2 mimétique par voie inhalée à action rapide et de courte durée» que votre médecin vous aura prescrit à cet effet.

Le soulagement habituellement obtenu avec le bronchodilatateur bêta-2 mimétique par voie inhalée doit alors être observé rapidement.

EN CAS D'ÉCHEC, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

Si la dose habituellement efficace de ce médicament devient insuffisante, si les crises ou les épisodes de gêne respiratoire deviennent plus fréquents, il faut craindre une aggravation de la maladie, consultez rapidement votre médecin qui réévaluera votre traitement.

Précautions d'emploi

Ce produit, administré par voie inhalée, doit atteindre l'extrémité des petites bronches pour agir efficacement. En cas d'encombrement des voies respiratoires (par des mucosités abondantes) ou d'infection, son efficacité peut être diminuée. Il convient de consulter rapidement votre médecin afin qu'il instaure un traitement adapté.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN (en particulier certains médicaments à base de kétoconazole ou de ritonavir).

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger du traitement le mieux adapté à votre cas.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Sportifs

Sportifs, attention cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

La posologie est strictement individuelle et sera adaptée par votre médecin en fonction de la sévérité de l'asthme.

La dose quotidienne est habituellement répartie en 2 prises par jour.

À titre indicatif, la posologie quotidienne de ce médicament se situe :
- chez l'adulte : entre 4 et 40 inhalations par jour habituellement réparties en 2 prises dans la journée. Il existe des présentations plus fortement dosées, mieux adaptées pour l'administration des posologies les plus élevées. Elles doivent être préférées dans ce cas.
- chez l'enfant de plus de 4 ans : entre 2 et 8 inhalations par jour habituellement réparties en 2 prises dans la journée.
- chez l'enfant de 1 à 4 ans : entre 2 et 4 inhalations par jour habituellement réparties en 2 prises dans la journée,

Chez l'enfant de plus de 4 ans, hormis dans les cas sévères, après plusieurs jours (ou semaines) de traitement lorsque les symptômes ont régressé et que l'asthme est contrôlé, votre médecin peut prescrire ce médicament en une prise quotidienne.
Dans tous les cas si les crises ou les épisodes de gêne respiratoire réapparaissent ou deviennent plus fréquents, la dose et le nombre de prises seront augmentés. Ne pas hésiter à demander rapidement l'avis de votre médecin pour qu'il adapte avec vous la posologie.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.
EN CAS DE PERSISTANCE DES TROUBLES, CONSULTER IMPÉRATIVEMENT VOTRE MÉDECIN.

Mode et voie d'administration
Inhalation par distributeur avec embout buccal.
Voie inhalée exclusivement.

L'efficacité de ce médicament est en partie dépendante du bon usage de l'appareil de distribution. Il convient donc de lire très attentivement le mode d'emploi. Au besoin, n'hésitez pas à demander à votre médecin de vous fournir des explications détaillées.

- Après avoir agité l'appareil (fig. 1), enlevez le capuchon pour dégager l'embout buccal,
- videz vos poumons en expirant profondément (fig. 2),
- présentez l'embout buccal à l'entrée de la bouche, le fond de la cartouche métallique dirigé vers le haut (fig. 3),
- commencez à inspirer et pressez sur la cartouche métallique tout en continuant à inspirer lentement et profondément (fig. 3),
- retirez l'embout buccal de la bouche et retenez votre respiration pendant au moins 10 secondes (fig. 4),
- se rincer la bouche après inhalation du produit,
- par mesure d'hygiène, l'embout buccal doit être nettoyé après emploi.

Contrôlez votre technique d'inhalation devant une glace, si une quantité importante de produit s'échappe par le nez ou la bouche, les points suivants sont à surveiller : soit la pression sur la cartouche métallique a eu lieu avant le début ou après la fin de l'inspiration, soit l'inspiration n'a pas été suffisamment profonde.
En cas de difficultés à utiliser le système d'inhalation, votre médecin peut vous conseiller l'utilisation d'une chambre d'inhalation.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré
Les prises seront réparties à intervalles réguliers.

Durée du traitement
Le traitement de la maladie asthmatique exige de votre part un effort quotidien. Ce médicament doit être utilisé très régulièrement et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

Conduite à tenir en cas de surdosage
Consulter un médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS.
Comme avec d'autres produits inhalés, il peut rarement survenir une majoration de la gêne respiratoire à la suite de l'inhalation du produit. Dans ce cas, ne pas renouveler la prise mais contacter votre médecin.
En cas de gêne persistante dans la bouche ou dans la gorge, avertir votre médecin, ne pas modifier ou arrêter le traitement sans son avis.
Une candidose buccale peut parfois apparaître. Elle ne nécessite pas nécessairement un arrêt de ce traitement mais la mise en route d'un traitement spécifique. Elle peut être prévenue en se rinçant la bouche après inhalation du produit.
Des cas d'éruptions cutanées allergiques ont été signalés.
Une gêne pharyngée, une dysphonie, une raucité de la voix, peuvent également survenir, elles peuvent être prévenues en se rinçant la bouche après inhalation du produit.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN.

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

Précautions particulières de conservation
À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Récipient sous pression : ne pas exposer à une chaleur excessive. Ne pas percer ni jeter au fe même vide.

CONDITIONS DE DELIVRANCE

Liste 1-uniquement sur ordonnance.
Médicament enregistré N° : 00/20A 077/262

GlaxoSmithKline