EUPNEX ®

OXELADINE

FORME ET PRESENTATION: Sirop à 0,1%, Flacon de 180 ml.

COMPOSITION: Par 100 ml

- Oxéladine (D.C.I) citrate ..... 100 mg
- Excipients:

Saccharose - Parahydroxybenzoate de méthyle

Jaune orangé (S), extrait aux oranges, chloroforme, Vanilline

Alcool éthylique à 96%.

Eau purifiée q.s.p ..... 100 ml

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :

Saccharose - Parahydroxybenzoate de méthyle - alcool éthylique 96%.

PROPRIETES:

Antitussif (R : système respiratoire)

Antitussif central, non opiacé, non antihistaminique.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Traitement symptomatique des toux de diverses étiologies grippales, rhinopharyngites, trachéites, Laryngites des broncho-pneumopathies, coqueluche ou de la rougeole, toux spasmodique et réflexe.

CONTRE-INDICATIONS:

Allergie à l'un des constituants.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

(MISE EN GARDE)

- Les toux productives, qui sont un élément fondamental de la défense broncho-pulmonaire sont à respecter.
- IL est illogique d'associer un expectorant ou un mucolytique à un antitussif.
- Avant de prescrire un traitement antitussif; il convient de rechercher les causes de la toux qui requièrent un traitement spécifique.
- Si la toux résiste à un antitussif administré à une posologie usuelle, on ne doit pas procéder à une augmentation des doses, mais à un réexamen de la situation clinique.
- En cas de doute demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur en saccharose.
- Ne pas l'administrer aux enfants de moins de 5 ans.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament chez la femme enceinte et la femme qui allaite.

SURDOSAGE :

- Hospitaliser le sujet et surveiller ses fonctions respiratoires et cardiovasculaires.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE

Adultes:3 à 4 cuillères à café par jour.

Enfants:

- (20 à 30kg) soit environ de 6 ans à 10 ans
  1 cuillère à café 2 ou 3 fois par jour.
- (30 à 50kg) soit environ de 10 ans à 15 ans
  1 cuillère à café 3 ou 4 fois par jour.

Date de révision : JUILLET 2003

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

Fabriqué par

GROUPE SAIDAL
Filiale pharmal
Constantine/ ALGERIE