NÉO-CODION® nourrisson sirop
benzoate de sodium, grindélia, polygala

FORMES et PRÉSENTATIONS
Sirop : Flacon de 125 ml.
COMPOSITION

	p c à c	*par 100 ml*
Benzoate de sodium	74,1 mg	1,4820 g
Grindélia, teinture	30,8 mg	0,6175 g
Sirop de polygala	3,964 g	79,2870 g

Excipients : acide ascorbique, gallate de propyle, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), vanilline, saccharose, solution concentrée d'hydroxyde de sodium qsp pH 6, eau purifiée.
Arômes : framboise, orange.
Colorants (arôme framboise) : azorubine (E 122), rouge cochenille A (E 124), tartrazine (E 102).
Titre alcoolique (v/v) : 2,22 %.
Une cuillère à café contient 3 g de saccharose, 88 mg d'éthanol et 2 mg de sodium.
Excipients à effet notoire : parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), azorubine (E 122), rouge cochenille A (E 124), tartrazine (E 102),saccharose.
INDICATIONS
Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé au nourrisson de plus de 3 mois.
1 cuillère à café, 2 à 3 fois par jour.
Contre - Indications
Hypersensibilité à l'un des constituants, notamment aux colorants et aux parabènes.
MISES EN GARDE et PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Ce médicament contient de faibles quantités d'alcool inférieures à 100 mg/ dose.
Tenir compte de la teneur en alcool de ce médicament (cf Composition).
En cas d'expectoration grasse et purulente, en cas de fièvre ou en cas de maladie chronique des bronches et des poumons, procéder à un réexamen de la situation clinique.
Les toux productives, qui représentent un élément fondamental de la défense bronchopulmonaire, sont à respecter.
L'association de mucomodificateurs bronchiques avec des antitussifs et/ou des substances asséchant les sécrétions (atropiniques) est irrationnelle.
L'indication ne justifie pas de traitement prolongé.
Liées à la présence des colorants : possibilité de réactions allergiques, y compris d'asthme, en particulier chez les patients allergiques à l'aspirine. En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose.
Précautions d'emploi :
En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur en saccharose (3g par dose).
EFFETS INDÉSIRABLES
Possibilité de troubles digestifs (nausées, vomissements). Réactions d'hypersensibilité.
Liés à la présence de parabènes (parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle) : risque d'eczéma et exceptionnellement, réactions immédiates avec urticaire et bronchospasme.
Conditions de conservation : conserver à une température ne dépassant pas + 25°C
Détenteur de la décision d'enregistrement : **BOUCHARA-RECORDATI**
68, rue Marjolin
92300 Levallois-Perret France
Fabriqué et conditionné par :
SOMEDIAL
BP 128 Zone Industrielle - Oued Smar El Harrach Alger
D.E.N° : 07/98/20C 036/269
Date de mise à jour de la notice : Mars 2014

CC 019