PREZIVA 10mg

Prazépam

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE:
Prazépam 10 mg. Excipient :
q.s.p un comprimé de 150 mg.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE : Benzodiazépine (anxiolytique).
(**N** : système nerveux central).

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :
Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants.

ATTENTION !
DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT :
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : hypersensibilité aux benzodiazépines, insuffisance respiratoire grave, syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires durant le sommeil) , allergie connue à cette classe de produits.
Il ne doit pas être utilisé, sauf avis contraire du médecin, en cas de myasthénie ou d'allaitement.
En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
MISES EN GARDE SPÉCIALES :
Ne jamais arrêter brutalement ce traitement, en raison du risque d'apparition d'un phénomène de sevrage . Celui-ci se caractérise par l'apparition,en quelques heures ou en quelques jours , de symptômes tels que anxiété importante , insomnie , douleurs musculaires mais on peut observer également de l'agitation , une irritation, des migraines, une sensibilité anormale au bruit et à la lumière, etc.
La diminution très progressive des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé.
Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de rebond sans gravité peut se produire, avec réapparition transitoire des symptômes (anxiété, insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement.
Ce médicament peut être à l'origine de troubles de la mémoire . Ceux-ci surviennent le plus souvent dans les heures qui suivent la prise du produit.
Chez certains sujets,en particulier l'enfant et la personne âgée,ce médicament peut entrainer des effets contraires aux effets recherchés : aggravation de l'insomnie, cauchemars , nervosité, irritabilité, agitation, agressivité, accès de colère, idées délirantes, hallucinations, troubles du comportement.Dans ce cas, vous devez interrompre le traitement et consulter votre médecin.
En raison de la présence de lactose ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie , de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
La prise de ce médicament nécessite un suivi médical renforcé, notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie chronique du foie , d'alcoolisme, et d'insuffisance respiratoire.
Un contrôle régulier par votre médecin est nécessaire , notamment du fait du risque de survenues d'idées suicidaires.
La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.
En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments , il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
L'utilisation de ce médicament est à éviter, dans la mesure du possible, durant les trois premiers mois de grossesse.
Dans le cas où ce médicament doit être prescrit jusqu'à l'accouchement, il est nécessaire d'effectuer une surveillance médicale du nouveau-né.
Ce médicament passe dans le lait maternel : en conséquence, l'allaitement est déconseillé.
Conducteurs et utilisations de machines :
L'attention est attirée sur la somnolence et la baisse de la vigilance attachées à l'emploi de ce médicament.
Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients : Lactose
COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT:
Posologie : La posologie est strictement individuelle ; se conformer à la prescription de votre médecin.
Mode et voie d'administration : Voie orale.
Durée du traitement : La durée de prescription de ce médicament ne peut dépasser 12 semaines.
conduite à tenir en cas de surdosage :
prévenez immédiatement un médecin
Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise :
Prenez la dose suivante à l'heure habituelle ; ne doublez pas la dose
Risque de syndrome de sevrage : Se reporter à la rubrique « mises en garde spéciales ».
EFFETS NON SOUHAITES ET GÊNANTS:
-Somnolence (surtout chez les personnes âgées), baisse de vigilance , fatigue, troubles de mémoire, sensation d'ivresse , faiblesse musculaire.
-Effets contraires aux effets recherchés : agitation , agressivité , irritation, tension, modification de la conscience, troubles du comportement (voir mises en garde spéciales).
-Dépendance physique et psychique avec syndrome se sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement (Voir mise en garde spéciales).
-Éruption avec ou sans démangeaison.
-Modification de la libido.
Signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
Conditions de délivrance : Ce médicament est inscrit sur la liste I.
Conservation : Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur l'étui.
Présentation : Boite de 40 comprimés sécables.

Fabriqué par :
Laboratoire BIOGALENIC
Zone Industrielle Zighoud Youcef
Constantine 25200 ALGERIE