

BROMAZEPAM 6 MG - Comprimé

COMPOSITION:

Bromazépam comprimé, quadrisécable de 6 mg.
Excipients: Cellulose microcristalline, lactose monohydraté, talc, stéarate de magnésium.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE BENZODIAZEPINE (anxiolytique).

(N: Système nerveux central).

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT:

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT:

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:

- Insuffisance respiratoire grave,
- Insuffisance hépatique grave,
- Allergie connue à cette classe de produits.

Il ne doit pas être utilisé, sauf avis contraire du médecin, en cas de myasthénie ou d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES:

Ne jamais arrêter BRUTALEMENT ce traitement, en raison du risque d'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de symptômes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires mais on peut observer également de l'agitation, une irritabilité, des migraines, sensibilité anormale au bruit ou à la lumière.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété, insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement.

Ce médicament peut être à l'origine de troubles de la mémoire. Ceux-ci surviennent le plus souvent dans les heures qui suivent la prise.

Chez certains sujets, en particulier l'enfant et la personne âgée, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché: agitation, agressivité, irritabilité, tension, modifications de la conscience, troubles du comportement. Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez rapidement votre médecin.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndromes de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical renforcé, notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie chronique du foie, de myasthénie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.

Un contrôle régulier par votre médecin est nécessaire, notamment du fait du risque de survenue d'idées suicidaires. La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

L'utilisation de ce médicament est à éviter, dans la mesure du possible, durant les trois premiers mois de la grossesse. Dans le cas où ce médicament doit être prescrit jusqu'à l'accouchement, il est nécessaire d'effectuer une surveillance médicale du nouveau-né.

Ce médicament passe dans le lait maternel: en conséquence, l'allaitement est déconseillé.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES:

L'attention est attirée sur la somnolence et la baisse de la vigilance attachées à l'emploi de ce médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS: Lactose.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Voie orale.

La posologie est strictement individuelle: se conformer à la prescription de votre médecin traitant.

DURÉE DU TRAITEMENT:

La durée de prescription de ce médicament ne peut dépasser 12 semaines.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE:

PRÉVENEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

CONDUITE A TENIR AU CAS OÙ L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ÉTÉ OMISE

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle; NE DOUBLEZ PAS LA DOSE.

EFFETS NON SOUHAITES ET GÊNANTS:

- Somnolence (surtout chez la personne âgée), baisse de vigilance, fatigue, troubles de mémoires, sensation d'ivresse, faiblesses musculaire,
- Effets contraires aux effets recherchés: agitation, agressivité, irritabilité, tension, modifications de la conscience, troubles du comportement,
- Dépendance physique ou psychique avec syndromes de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement (voir Mises en gardes spéciales).
- Eruption avec ou sans démangeaison,
- Modifications de la libido.

CONSERVATION:

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Fabriqué par :
BIOGALENIC

ZI Zighoud Youcef
CONSTANTINE 25200 - Algérie