G-Sulpiride

Sulpiride 50 mg

COMPOSITION
Sulpiride.....50.00 mg
Excipients : Lactose monohydraté,méthylcellulose, talc, stéarate de magnésium.

FORME PHARMACEUTIQUE
Gélule. Boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
ANTIPSYCHOTIQUE NEUROLEPTIQUE
BENZAMIDE (N : SYSTÈME NERVEUX)

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT
Ce médicament est Indiqué dans le traitement de certaines formes d'anxiété chez l'adulte et dans le traitement de certains troubles du comportement de l'adulte et de l'enfant de plus de 6 ans.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:
-allergie au sulpiride ou à l'un des constituants de la gélule,
- phéochromocytome (atteinte de la glande médullosurrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),
-en association avec:
*les agonistes dopaminergiques en dehors du cas du patient parkinsonien,
*les médicaments donnant des torsades de pointes (troubles graves du rythme cardiaque) : les antiarythmiques de classe la (quinidine, hydroquinidine, disopyramide...), Les antiarythmiques de classe III (amiodarone, sotalol, dofetilide, ibutilide...), certains neuroleptiques (thioridazine, chlorpromazine, lévomépromazine, trifluopérazine, cyamémazine, sultopride, amisulpiride, tiapride, pimozide, halopéridol, dropéridoL.), et autres médicaments tels que: bépridil, cisapride, diphémanil, érythromycine IV, mizolastine, vincamine IV...
Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin dans les cas suivants:
- allaitement,
- en association avec:
*l'alcool, l'halofantrine, la pentamidine, la sparfloxacine, la lévodopa et les agonistes dopaminergiques utilisés chez le patient parkinsonien.
(cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES
En cas d'apparition de fièvre inexpliquée, de pâleur ou de forte transpiration, Il est impératif d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

Afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. Chez l'enfant, un suivi médical régulier est indispensable. La prise de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.
En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Afin que votre médecin puisse adapter la posologie et/ou la surveillance de votre traitement , Il est nécessaire de le prévenir en cas de:
-maladie cardiaque,
-maladie de Parkinson,
-insuffisance rénale,
-antécédents de convulsions (ancienne ou récente), épilepsie.
La prise de boissons alcoolisées est fortement déconseillée pendant la durée du traitement.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Ce médicament ne doit pas être utilisé avec certains médicaments (cf. Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament).

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment l'halofantrine, la pentamidine, la sparfloxacine et certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson, Il FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.
Si ce médicament vous est prescrit au cours de la grossesse, respectez les doses et la durée de traitement établies par votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre.
L'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement par ce médicament.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS
Lactose.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
La posologie est variable et doit être adaptée à chaque cas.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
VOIE ORALE.

DURÉE DU TRAITEMENT
SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
En cas de prise d'une dose excessive de médicament, prévenir immédiatement un médecin ou un service d'urgence en raison du risque de survenue de troubles cardiaques graves.

EFFETS NON SOUHAITES ET GÊNANTS
CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS:
- absence de règles, augmentation du volume des seins, écoulement de lait par le mamelon en dehors des périodes normales d'allaitement,
- impuissance, frigidité,
- prise de poids,
- somnolence,
- tremblements, rigidité et/ou mouvements anormaux, sensation de vertiges lors du passage de la position allongée ou assise à la position debout,
-troubles du rythme cardiaque,
- exceptionnellement : fièvre inexpliquée, sudation, pâleur, modification de la tension artérielle, altération de la conscience, rigidité musculaire (cf. Mises en garde spéciales).

N'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien et à signaler tout effet non souhaité et gênant, en particulier ceux qui ne seraient pas mentionnés dans cette notice.

CONSERVATION
NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Pas de précautions particulières de conservation.

Fabriqué par :
BIOGALENIC
ZI Zighoud Youcef
25200 CONSTANTINE - Algérie