HALOPERIDOL BGL

Halopéridol 2mg/ml
Solution buvable en gouttes

FORME ET PRESENTATION :
Solution buvable à 2mg/ml, flacon compte-gouttes de 20 ml .

COMPOSITION :
Halopéridol..... 0.2 g
Excipients : QSP pour 100 ml

CLASSE THERAPEUTIQUE :
Antipsychotique neuroleptique, butyrophénone

INDICATION :
Ce médicament est préconisé dans certains troubles du caractère ou du comportement ainsi que lors des vomissements survenant après une radiothérapie.

CONTRE INDICATIONS :
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Allergie connues à l'halopéridol (éruption cutanée, démangeaisons, difficultés à respirer ou gonflement de la face).
- Maladie de Parkinson.
- Association à la Levodopa.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
- Epilepsie, troubles hépatiques ou rénaux, affectations cardio vasculaires graves.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :
Halopéridol peut modifier l'action de certains médicaments :
Les anti-parkinsoniens (lévodopa)
Les sédatifs et les antalgiques.
Les anti-dépresseurs (lithium)
Les anti-hypertenseurs (guanéthidine)
Alcool : abstenez-vous de boissons alcoolisées pendant la durée du traitement car Halopéridol augmente les effets de l'alcool.

Grossesse : En cas de grossesse ou de désir de grossesse, informez votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Halopéridol.

ALLAITEMENT : Il existe un passage d'Halopéridol dans le lait maternel, par conséquent l'allaitement est déconseillé pendant ladurée du traitement.

POSOLOGIE :

En *PSYCHIATRIE* : La posologie est strictement individuelle .
-Adultes : 10 à 400 gouttes par jour (1ml= 20 gouttes = 2mg d'Halopéridol);
-Enfants : la posologie doit être lentement croissante, afin d'aprécier la susceptibilité individuelle.
La dose initiale sera faible, ne dépassant pas 3 à 6 gouttes par jour; la dose sera augmentée progressivement jusqu'à l'obention de :
- La moitié de la dose de l'adulte pour les enfants plus de 5 ans soit 20 mg par jour;
-Le quart de la dose de l'adulte pour l'enfant de 2 à 5 ans soit 10 mg par jour .
En *GASTRO-ENTEROLOGIE* : La dose recommandée et de 2 mg d'Halopéridol, 6 à 8 fois par jour.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES :
L'attention est attirée notamment chez les conducteurs et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament. Il est donc recommandé de ne pas utiliser de machines et de ne pas conduire avant que votre médecin n'ait évalué votre réaction à l'Halopéridol.

EFFETS INDESIRABLES :
-L'Halopéridol a une faible action anticholinergique, il peut en résulter occasionnellement une sècheresse de la bouche.
-Des dyskinésies tardives ne sont pas exclues au cours de cures prolongées.
-Syndrome extrapiramidal, cédant partiellement aux anti - parkinsoniens anticholinergiques.
-Des réactions allergiques n'ont été que très rarement observées. Des éruptions cutanées peuvent parfois survenir.

CONSERVATION :
Conserver à température entre 15 et 25°C, à l'abri de la lumière.
TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
Liste I : Uniquement sur ordonnance - Respecter les doses prescrites.

Fabriqué par : **LABORATOIRE BIOGALENIC**
Zone Industrielle ZighoudYoucef 25200 Constantine Algérie