Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

TRUSOPT® 2 % collyre en solution

La substance active est :
le chlorhydrate de dorzolamide ..... 22,3 mg
correspondant en dorzolamide base ..... 20,0 mg
pour 1 ml

Les autres composants sont :
l'hydroxyéthylcellulose, le mannitol, le citrate de sodium, l'hydroxyde de sodium, le chlorure de benzalkonium, l'eau pour préparations injectables.

Titulaire/ Fabricant
Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret
3, avenue Hoche
75114 PARIS cedex 08
FRANCE

1. QU'EST-CE QUE TRUSOPT 2%, collyre en solution ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament se présente sous la forme de collyre en solution en flacon de 5 ml.
C'est un ANTIGLAUCOMATEUX par voie locale.

INHIBITEUR DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE.
- TRUSOPT est indiqué pour faire baisser la pression oculaire chez les patients atteints d'hypertension oculaire ou de certains types de glaucomes.
- D'autres traitements du glaucome par voie locale pourront être associés à TRUSOPT chez certains patients.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE TRUSOPT 2%, collyre en solution ?

Ne pas prendre TRUSOPT 2%, collyre en solution :
- si vous êtes allergique à l'un de ses constituants,
- si vous avez des problèmes rénaux sévères.

Prendre des précautions particulières avec TRUSOPT 2%, collyre en solution dans les cas suivants :
Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Si vous portez des lentilles de contact souples, consultez votre médecin avant d'utiliser TRUSOPT. Ce collyre contient un conservateur, le chlorure de benzalkonium, qui peut se déposer sur les lentilles de contact souples. Par conséquent, il ne doit pas être administré en présence de ces lentilles ; elles doivent être enlevées avant l'application des gouttes et ne doivent pas être remises avant un délai de 15 minutes après instillation.
- En cas de maladies du foie ou d'antécédents de maladie du foie, informez votre médecin.
- En cas de réaction allergique (éruption de la peau ou démangeaisons), arrêtez le traitement et contactez votre médecin.
- En cas d'irritation oculaire ou de tout autre symptôme oculaire (rougeur de l'œil, gonflement des paupières), contactez votre médecin sans tarder.
- En cas d'antécédents médicaux, incluant problèmes oculaires ou chirurgie oculaire, ou d'antécédents allergiques, n'oubliez pas d'en parler à votre médecin.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse
Si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être, informez-en votre médecin. Vous ne devez pas utiliser TRUSOPT pendant la grossesse.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement
Si vous allaitez ou si vous avez l'intention d'allaiter, informez-en votre médecin. Vous ne devez pas utiliser TRUSOPT pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :
Possibilité d'effets indésirables tels qu'étourdissements et troubles de la vision pouvant altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines (voir aussi la rubrique « Quels sont les effets indésirables éventuels de TRUSOPT 2 %, collyre en solution »).

Liste des excipients à effet notoire : Chlorure de benzalkonium.

Utilisation ou prise d'autres médicaments :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris les traitements par collyres et l'aspirine, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT PRENDRE TRUSOPT 2 %, collyre en solution ?

En monothérapie : 1 goutte dans l'œil (les yeux) atteint(s), trois fois par jour.

En association à un bêta-bloquant à usage ophtalmique : 1 goutte dans l'œil (les yeux) atteint(s), deux fois par jour.

En cas de remplacement d'un autre traitement antiglaucomateux par le dorzolamide : interrompre l'autre médicament après la dernière prise de la journée à la dose appropriée puis commencer le dorzolamide le jour suivant.

En cas d'utilisation concomitante de plusieurs collyres : les instillations successives de chaque collyre doivent être espacées d'au moins 10 minutes.

Voie ophtalmique.
- Instillez la goutte de solution ophtalmique dans le cul de sac conjonctival inférieur, en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant vers le haut.
- Ne touchez pas l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.
- Evitez tout contact de l'embout du flacon, car cela pourrait contaminer le contenu du flacon.

Utilisation chez l'enfant :
La tolérance et l'efficacité n'ayant pas été établies chez l'enfant, l'emploi de ce médicament n'est pas recommandé.
Respectez la prescription de votre médecin.
Si vous devez arrêter le traitement, contactez votre médecin.

Mode d'emploi :

Flacon OCUMETER PLUS à usage ophtalmique :
1. Avant d'utiliser ce collyre pour la première fois, assurez-vous que la languette de sécurité sur le devant du flacon ne soit pas déchirée. Un espace entre le flacon et le bouchon est normal lorsque le flacon n'est pas ouvert.

2. Déchirez la languette de sécurité pour rompre l'inviolabilité.



3. Pour ouvrir le flacon, dévissez le bouchon en tournant comme indiqué par les flèches.

4. Inclinez la tête vers l'arrière et tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas pour pouvoir instiller les gouttes entre la paupière et l'œil.

5. Renversez le flacon en le tenant au niveau du poussoir avec le pouce et l'index (voir schémas). Pressez doucement jusqu'à ce qu'une seule goutte tombe dans l'œil comme indiqué par votre médecin. NE TOUCHEZ PAS L'ŒIL OU LA PAUPIERE AVEC L'EMBOUT DU FLACON.



6. Répétez les étapes 4 et 5 pour l'autre œil si votre médecin vous l'a prescrit.
7. Revissez le bouchon en tournant jusqu'à ce qu'il soit fermement en contact avec le flacon. Ne serrez pas trop fort le bouchon.
8. L'embout est conçu pour délivrer une goutte pré-calibrée ; par conséquent, n'élargissez pas le trou de l'embout.
9. Lorsque vous n'arrivez plus à extraire de gouttes, il restera un peu de collyre dans le flacon. Cela ne doit pas vous inquiéter car une quantité supplémentaire de TRUSOPT a été ajoutée pour vous permettre d'avoir le nombre suffisant de gouttes comme prescrit par votre médecin.
N'essayez pas d'extraire du flacon l'excès de collyre.

Si vous avez l'impression que l'effet de TRUSOPT 2 %, collyre en solution est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de TRUSOPT 2 %, collyre en solution, que vous n'auriez dû ou si le contenu du flacon a été avalé, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre TRUSOPT 2 %, collyre en solution :
Si vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prévue, instillez-la le plus tôt possible après l'oubli. Cependant, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante.
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par TRUSOPT 2 %, collyre en solution est arrêté :
Si vous interrompez votre traitement, votre pression intraoculaire peut augmenter et entraîner une détérioration de votre vision. N'interrompez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS de TRUSOPT 2 %, collyre en solution ?

Comme tous les médicaments, TRUSOPT 2 %, collyre en solution, est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Avec ce collyre il est possible que vous ayez :
- des manifestations oculaires telles que des brûlures et des picotements, une vision brouillée, des démangeaisons oculaires, un larmoiement, une conjonctivite (se manifestant par une inflammation avec rougeur et/ou douleur de l'œil), une inflammation palpébrale et/ou une irritation palpébrale incluant rougeur et/ou des lésions croûteuses palpébrales, un œdème de la cornée (épaississement de l'enveloppe transparente de l'œil), une iridocyclite (se manifestant par une baisse de la vision et une sensation de gêne à la lumière), une myopie transitoire (qui disparaît à l'arrêt du traitement), une baisse de la pression dans l'œil et un décollement de la choroïde après traitement chirurgical.

Après avoir mis les gouttes dans l'œil, vous pouvez aussi ressentir ou avoir plus rarement :
- une réaction allergique généralisée incluant un gonflement du visage, rash, une urticaire, des démangeaisons, un essoufflement, rarement un spasme bronchique (difficulté à respirer) ;
- une sécheresse de la bouche, une sensation de goût amer, des nausées, une irritation de la gorge ;
- une dermite de contact (eczéma) ;
- des maux de tête, une sensation de fatigue, des étourdissements, des paresthésies (sensations de picotements), des saignements de nez ;
- une lithiase (calcul) urinaire.

En présence de tout symptôme anormal, consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TRUSOPT 2 %, collyre en solution ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver le flacon dans le conditionnement extérieur d'origine, à l'abri de la lumière.

Après ouverture du flacon, le médicament peut être conservé 28 jours maximum.

Ne pas utiliser après la date de préemption figurant sur le flacon.