AZOPT® 10 mg/ml collyre en suspension

Brinzolamide

Lire l'intégralité de cette notice attentivement avant de commencer à utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de causer du tort à cette personne, même si elle présente la même maladie que vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

La substance active est brinzolamide 10 mg/ml.

Autres composants : chlorure de benzalkonium, carbomère 974P, édétate disodique, mannitol, eau purifiée, chlorure de sodium, tyloxapol.

Des petites quantités d'acide chlorhydrique ou d'hydroxyde de sodium sont parfois ajoutées pour conserver des niveaux d'acidité (niveau de pH) normaux.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'AZOPT est Alcon Laboratories (UK) Ltd., Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR, Royaume Uni.
Le fabricant d'AZOPT est Alcon Cusí S.A., Camil Fabra 58, E-08320 El Masnou, Barcelone, Espagne.

1. QU'EST-CE QU'AZOPT ?

AZOPT collyre est utilisé pour traiter une pression élevée à l'intérieur de l'œil. Cette pression peut conduire à une maladie appelée **glaucome**.

Pression élevée à l'intérieur de l'œil. Vos globes oculaires contiennent un liquide aqueux incolore qui nourrit l'intérieur de l'œil. En permanence du liquide est évacué et d'autre liquide est produit. Si l'œil se remplit plus vite qu'il ne se vide, la pression à l'intérieur de l'œil augmente. Si celle-ci est trop forte, cela peut endommager votre vue.

AZOPT fait partie d'un des groupes de médicaments pour le glaucome appelé inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Il agit en réduisant la production de liquide, abaissant ainsi la pression dans l'œil. Il peut être utilisé seul ou avec d'autres collyres appelés bêta-bloquants, qui réduisent également la pression.

AZOPT est un liquide laiteux (une suspension) fourni en boîte de un flacon plastique (drop-tainer) de 5 ml avec un bouchon à vis.

2. AVANT D'UTILISER AZOPT

Ne pas utiliser AZOPT...

- **si vous avez des problèmes rénaux,**
- **si vous êtes allergique** au brinzolamide ou à l'un des autres composants,
- **si vous êtes allergique aux médicaments appelés sulfonamides,** AZOPT peut entraîner une allergie du même type,
- **si vous avez une acidose hyperchlorémique** (trop d'acidité dans votre sang).

Dans ces cas demandez l'avis de votre médecin.

Prendre des précautions particulières avec AZOPT...

- **si vous avez des problèmes hépatiques,** parlez-en à votre médecin ;
- **si vous avez les yeux secs ou des problèmes de cornée,** parlez-en à votre médecin ;
- **si vous portez des lentilles de contact souples ;** N'utilisez pas le collyre quand vous portez vos lentilles. Attendez 15 minutes après avoir utilisé le collyre avant de remettre vos lentilles sur vos yeux. Un conservateur contenu dans AZOPT (chlorure de benzalkonium) peut causer des irritations oculaires et est aussi connu pour teinter les lentilles de contact souples.

AZOPT ne doit pas être utilisé chez les personnes de moins de 18 ans.

Grossesse / allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous pouvez le devenir, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser AZOPT.
Si vous allaitez, n'utilisez pas AZOPT ; il peut passer dans votre lait.

Conduite de voiture ou utilisation de machines

Vous pouvez trouver que votre vision est trouble juste après avoir utilisé AZOPT. Certaines personnes ont eu envie de dormir ou ont ressenti des vertiges en prenant AZOPT. Ne conduisez pas de voiture et n'utilisez pas de machines avant que ces effets aient disparu.

AZOPT et les autres médicaments

Indiquez à votre médecin si vous prenez un autre inhibiteur de l'anhydrase carbonique (acétazolamide ou dorzolamide, voir section 1 QU'EST-CE QU'AZOPT ?).

Veuillez indiquer à votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez (ou avez pris récemment) un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT UTILISER AZOPT

La posologie usuelle

Adultes : **1 goutte dans l'œil ou les yeux, deux fois par jour** – matin et soir.
Utilisez cette posologie à moins que votre médecin ne vous dise de faire différemment. Utilisez AZOPT dans les deux yeux uniquement si votre médecin vous a dit de le faire. Prenez-le aussi longtemps que votre médecin vous l'a dit.

Utilisez AZOPT **seulement** en gouttes dans les yeux.

- Prenez le flacon d'AZOPT et un miroir.
- Lavez-vous les mains.
- Agitez le flacon et enlevez le capuchon.
- Tenez le flacon, tête en bas, entre le pouce et le majeur.
- Penchez la tête en arrière. Avec un doigt propre, tirez doucement votre paupière vers le bas pour créer un sillon entre la paupière et l'œil. La goutte sera déposée à cet endroit (figure 1).
- Rapprochez l'embout du flacon de votre œil. Utilisez un miroir pour vous aider.
- **Ne touchez pas votre œil ou vos paupières, ou les surfaces voisines ou d'autres surfaces avec le compte goutte.** Cela peut infecter le collyre.
- Appuyez légèrement sur la base du flacon pour libérer une goutte d'AZOPT à chaque fois.
- **Ne comprimez pas le flacon :** il est conçu pour qu'une légère pression sur la base suffise (figure 2).
- Après avoir utilisé AZOPT, appuyez avec un doigt sur le coin de votre œil près du nez (figure 3). Ceci permet d'empêcher AZOPT d'aller dans le reste du corps.
- Recommencez ces étapes pour l'autre œil, si vous devez traiter les deux yeux.
- Refermez bien le flacon immédiatement après usage.
- Utilisez un flacon avant d'en ouvrir un autre.

Si une goutte tombe à côté de votre œil, recommencez.

Si vous en avez trop dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes sauf quand le moment est venu de prendre la dose suivante.

Si vous oubliez de prendre AZOPT, utilisez une dose unique dès que possible, et reprenez ensuite la posologie habituelle. **Ne** prenez **pas** de dose double pour compenser.

Si vous utilisez un autre collyre, attendre au moins 5 minutes entre AZOPT et l'autre collyre.

4. EFFETS INDESIRABLES POTENTIELS

Certaines personnes qui utilisent AZOPT peuvent avoir des effets indésirables. Ils peuvent être désagréables mais la plupart d'entre eux passent rapidement.

Vous pouvez continuer à prendre le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables courants :
Jusqu'à 6 personnes sur 100 peuvent avoir un ou plusieurs de ces effets.

Effets oculaires : vision trouble transitoire ; sensation de brûlure ou de picotement juste après avoir utilisé le collyre ; sensation de corps étranger dans votre œil ; yeux rouges.

Effets généraux : goût amer ou acide, maux de tête.

Effets indésirables non courants :
Moins de 1 personne sur 100.

Effets dans l'œil : Ecoulement, douleur, démangeaison, inflammation ou dommage de la surface du globe oculaire, inflammation ou croûtes sur les paupières, augmentation des larmes, yeux secs, fatigue oculaire, vision anormale, flash de lumière, dépôt à la surface de l'oeil.

Effets dans le corps : Dérangement ou brûlure d'estomac, nausée, difficulté respiratoire, douleur thoracique, bronchite, bouche sèche, maux de gorge, problèmes au niveau nasal ou des sinus comprenant le nez qui coule ou qui saigne, saignement dans la bouche, engourdissement ou sensation de picotement des extrémités, dépression, vertige, perte de cheveux, irritations cutanées, éruption cutanée, toux.

Si vous notez d'autres effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. CONSERVER AZOPT

Ce médicament ne requiert pas de précautions particulières de conservation.

Vous devez jeter un flacon quatre semaines après l'avoir ouvert pour la première fois, pour éviter les infections. Inscrivez la date à laquelle vous avez ouvert chaque flacon dans l'espace ci-dessous et dans l'espace sur l'étiquette du flacon et la boîte.

Ouvert le :

Gardez le collyre dans un endroit sûr hors de portée et de vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée («EXP») figurant sur le flacon et la boîte.

Si vous avez d'autres questions à propos de vos médicaments, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Site de fabrication :
Alcon Cusí, S.A.
Camil Fabra 58
E-08320 El Masnou - Barcelone
Espagne

Numéro de décision d'enregistrement : 15/05/17 C 140/028.

Cette notice a été approuvée en septembre 2007.

Alcon®

600262