# **ISOTAMINE®**

Dihydroergotamine mesylate 2mg/ml, Solution pour gouttes buvables 50 ml

### FORME ET PRÉSENTATION:

Solution buvable en gouttes. Flacon de 50 ml (1000 gouttes)

1 ml de solution = 20 gouttes = 2 mg de principe actif

#### COMPOSITION:

## CLASSE PHARMACO THÉRAPEUTIQUE:

ANTIMIGRAINEUX (N: système nerveux central).

### **INDICATIONS:**

-Traitement des migraines et des céphalées d'origine vasculaire.

-Proposé dans le traitement de l'hypotension orthostatique.

## CONTRE-INDICATIONS:

Les associations à la troléandomycine, à l'érythromycine ou à la roxithromycine sont contre-indiquées. L'association à la josamycine est déconseillée.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

-Eviter la prise à ieun.

 -A utiliser avec précaution en cas d'insuffisance hépatique sévère et en cas d'insuffisance rénale sévère non compensée par hémodialyse.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:

Des accidents ischémiques (ergotisme) ayant été observés après emploi simultané de dihydroergotamine, par voie orale, et de troléandomycine, d'érythromycine ou de Roxithromycine, il est contre-indiqué d'associer ces médicaments.

Par prudence, il convient également d'éviter l'association avec un autre macrolide : La josamycine (un cas isolé).

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Les résultats des études réalisés chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène; en l'absence de donnée clinique chez l'homme, ces résultats expérimentaux ne permettent pas d'anticiper un effet malformatif dans l'espèce humaine.

Cependant, il existe un risque théorique à forte dose d'action contracturante sur l'utérus ; par conséquent, par mesure de prudence, éviter la prescription pendant la grossesse. En l'absence de données sur le passage de la dihydroergotamine dans le lait, le risque n'est pas connu, par conséquent ne pas prescrire pendant la période d'allaitement.

## POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI:

Voie orale

30 Gouttes (1,5 ml) 3 fois par jour, à prendre dans un demi verre d'eau au milieu des repas.

## **EFFETS NON SOUHAITÉS GÊNANTS:**

Possibilité de syndromes nauséeux surtout en cas de prise à jeun.

## **CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE:**

En cas de confirmation d'ergotisme vasculaire, un traitement d'urgence doit être administré en milieu hospitalier : il consiste en l'administration de l'héparine en perfusion associée à un vasodilatateur et éventuellement aux corticoïdes.

#### Liste II

#### CONSERVATION:

Entre 15 c° et 30 c° dans son emballage d'origine.

Date de révision: 02/2012

N° d'enregistrement: 04/15 B 021 / 073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants

#### LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P.: Z.I TARF Ouled Rahmoun, B.P. A75, EL. Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.44.04/05 Fax: 031.95.44.03/06/07 http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail: isopharm@gmail.com

