INPHA-Médis
Industrie Pharmaceutique

CICOLINA

Citicoline 100 mg/ml
Solution buvable
Flacon de 60 ml

1. QU'EST-CE QUE CICOLINA ?

Forme pharmaceutique

CICOLINA se présente sous forme de solution buvable.

Propriétés pharmacologiques

- La Citicoline stimule la biosynthèse des phospholipides structuraux de la membrane neuronale. La Citicoline au moyen de cette action améliore la fonction des mécanismes de membrane, tels que le fonctionnement des pompes à échange ionique et les récepteurs qui y sont insérés, dont la modulation est indispensable dans la neurotransmission.
- Des essais cliniques ont démontré que la Citicoline améliore les symptômes dans des situations d'hypoxie et d'ischémie cérébrale, telles que : perte de mémoire, labilité émotionnelle, manque d'initiative, difficultés pour les activités de la vie quotidienne et le soin personnel.
- Des essais cliniques ont également mis en évidence l'efficacité de la citicoline dans le traitement des troubles cognitifs, sensitifs, moteurs et neuropsychologiques d'étiologie dégénérative ou vasculaire.

Composition

Chaque ml contient :

Citicoline…..……..100mg

Excipients : Sorbitol 70%, hydroxybenzoate de méthyle, saccharine sodique, arôme framboise, colorant,
eau purifiée……...q.s.p 100 ml

2. DANS QUELS CAS UTILISER CICOLINA?

Traitement des troubles cognitifs, sensitifs, moteurs et neuropsychologiques d'étiologie dégénérative ou vasculo-cérébrale.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE CICOLINA?

Contre indications

Ne doit pas être administrée chez les patients à hypertonie ou parasympathique.

Interactions avec d'autres médicaments

CICOLINA renforce les effets du L-Dopa.

Incompatibilités

Ne doit pas être administrée conjointement avec des médicaments contenant du méclophénoxate.

4. COMMENT PRENDRE CICOLINA?

Posologie et mode d'administration

* **Posologie**

Adultes : 200 mg (2 ml), 3 fois par jour.

Enfants : 100 mg (1 ml), 2-3 fois par jour.

Chaque 1 ml contient 100 mg de citicoline. Ces doses pourront être modifiées selon le critère du médecin.

Mode d'administration

On administrera le produit à l'aide d'une seringue doseuse, d'après le schéma suivant :

1-Introduire la seringue doseuse avec le piston d 'injection faisant pression jusqu'au fond.

2-Aspirer le dosage indique en faisant tourner le piston d'injection, en tenant en compte que le liquide contenu dans la seringue coïncide exactement avec le niveau prescrit.

3-Administrer la préparation en la mélangeant avec un peu d'eau.

Après chaque administration on recommande de laver la seringue doseuse avec de l'eau.

Surdosage

Etant donné la rare toxicité de la préparation, on ne prévoit pas l'intoxication.

En cas de surdosage accidentel, instaurer un traitement symptomatique.

5. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

On n'a décrit que très peu de cas de légers troubles gastro-intestinaux.

6. COMMENT CONSERVER CICOLINA?

A conserver à une température inférieure à 30°C

7. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE ?

Sous ordonnance médicale

8. PRESENTATION ET NUMERO DE D.E.

Spécialité	Présentation	N° D.E.
CICOLINA	Solution buvable flacon de 60 ml	DE: 09 / 15B 045 / 317

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

Fabricant et Titulaire de la D.E
Les laboratoires INPHA-Médis
Siège sociale : 08,Rue Prosper Dubourg,Annaba-Algérie
Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44,Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.