PARKINANE® L.P. 5mg

Trihexyphénidyle (Chlorhydrate)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
- *Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire;*
- *Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre pharmacien.*

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

COMPOSITION:
Pour une gélule :
Parkinane LP 2mg: Chlorhydrate de trihexyphénidyle: 2mg
Parkinane LP 5mg: Chlorhydrate de trihexyphénidyle: 5mg
Excipients: Saccharose, Amidon de maïs, Polyvidone, Gomme laque décirée, Copolymère d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle (Eudragit L100), Talc, Gélatine, Colorants: Érythrosine, Bleu patenté V.

LISTES DES EXCIPIENTS A EFFETS NOTOIRES:
Saccharose, teneur pour:
-2mg: 38,57mg/gel
-5mg: 96,435mg/gel

FORME PHARMACEUTIQUE:
Gélules à libération prolongée.
Parkinane LP 2mg: boite de 50 gélules
Parkinane LP 5mg: boite de 20 gélules.

LISTE: 1

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE:
ANTI-PARKINSONIEN, ANTI-CHOLINERGIQUE
(N: Système nerveux central).

DETENTEUR DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT ET CONDITIONNEMENT:
UPC - zone Idustrielle N°49 le Rumel Constantine Algérie.
SOUS LICENCE: EISAI S.A.S,
Tour Manhattan, 5/6 place de l'Iris, 92095 Paris la Défense-France
Fabricant : OSMOPHARM SA.
Via alle Fornaci 6930 Bedano, Suisse.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT?
INDICATIONS THERAPEUTIQUES:
Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes Parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

ATTENTION!
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT?
CONTRE-INDICATIONS:
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- Allergie connue au trihéxyphénidyle ou à l'un des composants,
- Glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'oeil),
- Troubles de miction (difficultés pour uriner d'origine prostatique ou autre),
- Maladie cardiaque non contrôlée par le traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES:
NE PAS ARRETER BRUTALEMENT LE TRAITEMENT SANS AVIS MEDICAL
Une aggravation peut être observée chez les patients parkinsoniens présentant une détérioration intellectuelle.
En cas d'apparition de signes d'intolérance, les doses doivent être diminuées ou le traitement arrêté provisoirement.
En raison de présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase -isomaltase (maladies métaboliques rares).
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:
Prévenez votre médecin en cas de:
- Maladies obstructives intestinales et du tractus urinaire.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment les médicaments atropiniques (certains antidépresseurs, antihistaminiques, AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE – ALLAITEMENT:
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.
En l'absence d'étude chez la femme allaitante; l'allaitement est déconseillé en cas de traitement par ce médicament.
D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES:
L'attention des conducteurs de véhicules et des utilisateurs de machines est attirée sur la possibilité de troubles de la vision, lors de l'utilisation de ce médicament. Dans ce cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou d'engins mécaniques.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT?
POSOLOGIE:
La posologie est variable et doit être adaptée à l'intensité des troubles ainsi qu'à la susceptibilité individuelle de chaque patient.
La dose initiale est de 2mg
CONFORMEZ-VOUS STRICTEMENT À LA PRESCRIPTION DU MEDECIN

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION:
Voie orale
Avaler les gélules avec un verre d'eau.
Fréquence à laquelle le médicament doit être administré:
La dose quotidienne doit être administrée en une seule prise.
-Chez l'adulte: les doses varient de 4 à 15mg sans dépasser 20mg/jour.
-Chez le sujet agé: ne pas dépasser 10mg/jr. chez les juste agés qui peuvent être plus sensibles, la posologie doit être ajustée de façon très précise.

DUREE DU TRAITEMENT:
Vous devez impérativement respecter la posologie et la durée du traitement prescrites, en particulier, vous ne devez pas interrompre le traitement sans demander l'avis de votre médecin.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE:
Symptôme:
Sècheresse de la bouche, mydriase, paralysie de l'accomodation, tarissement des sécrétion et surtout tachycardie, agitation, confusion mentale et hallucination, dépression respiratoires.
Traitement:
Traitement symptomatique avec surveillence cardiaque et respiratoire en milieu hospitalier

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE:
L'interruption brutale du traitement peut provoquer la réapparition ou l'aggravation des symptômes.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES):
COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :
- Sècheresse de la bouche,
- Troubles de l'accommodation (Vision flou),
- Hypertonie oculaire (augmentation de la pression de l'oeil),
- Difficultés pour uriner,
- Constipation.

Ont été rapportés: confusion mentale, hallucinations, agitation en particulier chez le sujet âgé.
Ont aussi été rapportés de rares cas d'occlusion intestinale, constipation persistante, ballonnement important, et douleurs abdominales, de parotidites suppuratives (infection des glandes parotides) et d'éruptions cutanées.
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT, QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION:
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE:
Avril 2014

DE N°:
PARKINANE L.P 2 mg: 07/98/15D033/285
PARKINANE L.P 5 mg: 07/98/15D034/285

N01 PAR

UPC Eisai