

Parkidyl, 5 & 2 mg

Trihexyphénidyle

COMPOSITION :

Chlorhydrate de trihexyphénidyle 5 mg
Chlorhydrate de trihexyphénidyle 2 mg
Excipients : Lactose, amidon de blé (gluten), silice hydratée, talc, stéarate de magnésium.

FORME PHARMACEUTIQUE :

Comprimés, boîte de 20.

CLASSE PHARMACO -THÉRAPEUTIQUE :

ANTIPARKINSONNIEN ANTICHOLINERGIQUE
(N: SYSTÈME NERVEUX CENTRAL).

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neurologique.

ATTENTION !

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'oeil),
- difficultés pour uriner (d'origines prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du coeur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- en cas d'intolérance ou d'allergie au gluten en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Des perturbations psychiques peuvent survenir : dans tous les cas, avertir votre médecin.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosemie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- En cas d'antécédents de maladie obstructive de l'intestin (telle que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Prévenir votre médecin en cas de grossesse. L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

L'usage de PARKIDYL peut induire des troubles de la vision ou de l'attention, rendant la conduite des véhicules dangereuse.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS:

Lactose, amidon de blé (gluten).

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE :

La posologie est variable et doit être adaptée à l'intensité des troubles ainsi qu'à la susceptibilité individuelle de chaque patient.

Elle est de 1 à 2 comprimés par jour en moyenne.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

FRÉQUENCE AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

DURÉE DU TRAITEMENT

SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas d'ingestion massive, contacter immédiatement un médecin ou votre centre anti-poison.

EFFETS NON SOUHAITES ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENTS PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS:

- Sécheresse de la bouche, troubles de la vision, rétention urinaire, constipation.

Ces effets sont plus fréquents chez les personnes âgées qui sont plus sensibles au traitement et qui peuvent manifester aussi une agitation ou des troubles psychiques, éventuellement dus à un dosage inadéquat. Si ces troubles surviennent, demander avis à votre médecin ou ajuster la posologie.

Ont été signalés quelques rares cas:

- d'inflammation du tissu de soutien des dents, secondaire à la sécheresse de la bouche, d'éruption cutanées, de dilatation du côlon, d'occlusion intestinale.

SIGNEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

Fabriqué par : **LABORATOIRE BIOGALENIC**

Zone d'Activité Zighoud Youcef CONSTANTINE 25200 - Algérie