

CLONAPRIME

Clomipramine

25 mg

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Clomipramine (sous forme de chlorhydrate) 25 mg par comprimés pelliculé.

Excipients : QSP 1 comprimé pelliculé

FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

INHIBITEURS NON SELECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ? (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué :

- Dans les épisodes dépressifs,
- Dans les troubles obsessionnels compulsifs (TOCs),
- Dans la prévention des attaques de panique (crises d'angoisse aiguës répétées),
- Dans les douleurs neuropathiques chez l'adulte.

Ⓜ) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ? (CONTRE INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Allergie connue à la Clomipramine ou à l'un de ses excipients,
- Risque connu de glaucome aigu (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- Difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- Infarctus du myocarde récent,
- Association avec certains autres antidépresseurs (proniazide, nialamide) ou le sulopride.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Ⓝ) MISES EN GARDE SPECIALES

Ne pas interrompre brusquement le traitement.

Comme pour tous les autres antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement, même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin. Dans certains cas, une accentuation de l'anxiété ou une angoisse peuvent survenir. Il faut consulter immédiatement votre médecin.

Si vous avez des idées noires, parlez-en à votre médecin.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, ce syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase- isomaltase (maladies métaboliques rares).

Ⓞ) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Une insomnie ou une nervosité peuvent également survenir en début du traitement.

Parlez-en à votre médecin le cas échéant.

Prévenez votre médecin en cas de :

- Maladie cardiaque,
- Crises convulsives (récentes ou anciennes), épilepsie,
- Troubles de la prostate,
- Maladies rénales ou hépatiques.

- Constipation chronique.

L'absorption de boissons alcoolisées est fortement déconseillée pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Ⓟ) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES OU AUTRES INTERACTIONS

IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS ; notamment avec certains antidépresseurs (moclobémide, toloxatone) avec certains médicaments agissant sur le système cardiovasculaire (clonidine, guanfacine et par voie injectable : adrénaline, noradrénaline, dopamine), linézolide (antibiotique) et avec les médicaments contenant de l'alcool.

Ⓠ) GROSSESSE - ALLAITEMENT :

Grossesse

Ce médicament dans des conditions normales d'utilisations, peut-être utilisé pendant la grossesse.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Allaitement

Ce médicament passe en faibles quantités dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter d'allaiter pendant la durée du traitement. DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

Ⓡ) CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

Ⓢ) LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE : Lactose.

Ⓣ) POSOLOGIE & VOIS D'ADMINISTRATION

Ce médicament vous a été personnellement délivré ou prescrit dans une situation précise. DANS TOUS LES CAS, SE REFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN. Voie orale.

Ⓤ) RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

De rares cas de syndrome de sevrage ayant été observés à l'arrêt du traitement, ne pas interrompre celui-ci sans l'avis de votre médecin.

Ⓥ) EFFETS INDESIRABLES

Sécheresse de la bouche, Constipation, Somnolence en particulier en début de traitement, ou insomnie, Prise de poids, Hypotension orthostatique Tachycardia, Sueurs, Difficultés pour uriner,

Augmentation du volume des seins, galactorrhée, bouffées de chaleur, sécrétion appropriée d'hormone antidiurétique, Impuissance, trouble de la libido, Réactions allergiques au niveau de la peau, Dysarthrie, mouvements anormaux, Possibilités de modifications du bilan.

Contactez alors rapidement votre médecin.

Aux doses élevées : Troubles cardiaques (troubles de la conduction et du rythme cardiaque).

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

Fabriqué par :
BIOGALENIC
Zi Zighoud Youcef
25200 CONSTANTINE - Algérie