



Composition :

Prof[®] suspension buvable : Chaque 5 ml de la suspension buvable contient 100 mg d'ibuprofène.

Excipients : édétate disodique, benzoate de sodium, acide citrique, saccharose, gomme de xanthan, avicel, sorbitol, glycérine, tween 80, colorant jaune, arôme liquide d'orange, eau purifiée.

Excipients à effet notoire : saccharose, sorbitol.

Prof[®] 400mg comprimé pelliculé : Chaque comprimé pelliculé contient 400mg d'ibuprofène.

Excipients : amidon, povidone, stéarate de magnésium, dioxyde de titane, cellulose, polyéthylène glycol, talc, croscarmellose sodique, aerosil 200, siméthicone.

Propriétés pharmacologiques :

L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), ayant des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antipyrétiques. Il agit en diminuant la synthèse des prostaglandines par inhibition de la cyclo-oxygénase.

Indications :

Prof[®] suspension buvable est indiqué, chez le nourrisson et l'enfant de 3 mois à 12 ans (soit environ 40 kg), dans :

- Le traitement de la fièvre et/ou des douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures,
- L'arthrite chronique juvénile.

Prof[®] 400mg comprimés est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) dans :

- Le traitement symptomatique au long cours :

* Des rhumatismes inflammatoires chroniques : polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes apparentés.

* de certaines arthroses invalidantes et douloureuses ;

- Le traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des :

* Rhumatismes abarticulaires tels que périarthrites scapulo-humérales, tendinites, bursites

* Arthroses,

* Lombalgies,

* Radiculalgies,

* Affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur ;

- Les règles douloureuses, maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires et courbatures.

Contre indications :

Prof[®] est contre indiqué chez les sujets présentant une hypersensibilité connue à l'un de ses composants.

Prof[®] est contre indiqué en cas d'asthme, d'ulcère de l'estomac, ou en cas d'insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque. Il est également contre indiqué dans le cas de maladies rares comme la porphyrie hépatique ou le lupus érythémateux disséminé.

Prof[®] est contre indiqué aussi au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus).

Précaution d'emploi :

L'ibuprofène ne doit pas être donné aux patients chez qui l'aspirine ou les autres AINS induisent des symptômes d'asthme, urticaire ou rhinite.

Varicelle : Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau.

Mises en garde :

En raison de la présence de saccharose dans la suspension, ce médicament ne doit pas être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase.

En cas de troubles de la vue apparaissant en cours de traitement, un examen ophtalmologique complet doit être effectué.

Au cours de traitements prolongés, il est recommandé de contrôler la formule sanguine, les fonctions hépatique et rénale.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée : l'utilisation de l'ibuprofène ne doit être envisagée que si nécessaire.

Entre 12 et 24 semaines d'aménorrhée (entre le début de la diurèse fœtale et 5 mois révolus) : une prise brève ne doit être prescrite que si nécessaire. Une prise prolongée est fortement déconseillée.

Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) : toute prise, même ponctuelle, est contre-indiquée.

Allaitement : Les AINS passant dans le lait maternel, il convient, par mesure de précaution, d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite.

Interactions médicamenteuses :

L'utilisation de l'ibuprofène avec les autres AINS (y compris l'aspirine), anticoagulants ou agents thrombolytiques, peut causer une hémorragie gastro-intestinale.

Informez votre médecin en cas de traitement par un diurétique, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un antagoniste de l'angiotensine II, un bêta-bloquant ou un

Posologie et mode d'utilisation :

Prof[®] suspension buvable est réservé à l'enfant, de 3 mois à 12 ans :

• Douleur et/ou fièvre : La posologie usuelle est de 20 à 30 mg/kg/jour en 3 prises par jour (sans dépasser 30 mg/kg/jour). Les prises systématiques, espacées de 8 heures, permettent d'éviter les pics de douleur ou de fièvre.

• Arthrite aigue juvénile : La posologie usuelle est de 30 à 40 mg/kg/jour en 4 prises par jour.

Prof[®] 400mg comprimés est réservé à l'adulte (plus de 15 ans) :

La posologie usuelle est de 1 comprimé à 400 mg, à renouveler si nécessaire sans dépasser 3 comprimés (soit 1200 mg par jour).

Avaler le comprimé sans le croquer, avec un grand verre d'eau.

Les comprimés sont à prendre de préférence au cours d'un repas. Les prises régulières permettent d'éviter les pics de fièvre ou de douleur. Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Surdosage :

En cas de surdosage avec Prof :

- Transférer immédiatement le patient en milieu hospitalier.
- Evacuer rapidement le produit ingéré par un lavage gastrique.
- Administrer du charbon activé pour diminuer l'absorption de l'ibuprofène.
- Instaurer un traitement symptomatique.

Effets indésirables :

Les effets indésirables les plus fréquents sont les troubles digestifs et la diarrhée.

D'autres effets indésirables peuvent se produire tels que :

- Troubles gastro-intestinaux tels que douleurs abdominales, nausées, anorexie, constipation. Un ulcère gastrique ou une hémorragie gastro-intestinale peuvent se produire occasionnellement.

- Des réactions allergiques qui peuvent être :

* Cutanées : éruption sur la peau, démangeaisons, œdème, urticaire, aggravation d'urticaire chronique ;

* Respiratoires de type crise d'asthme ;

* Générales : brusque gonflement du visage et du cou avec gêne respiratoire (œdème de Quincke)

- Des maux de tête (en cas d'usage prolongé), vertiges.

- Troubles des paramètres sanguins.

- Des troubles des fonctionnements des reins et du foie.

Consulter votre médecin ou pharmacien si l'un de ces effets est observé.

Conditions de conservation et de stockage :

Conserver à une température comprise entre (15-30)°C.

Ne pas utiliser le produit au-delà de la date limite d'expiration, ou si le produit présente des signes de détérioration.

Bien mélanger la suspension buvable avant l'utilisation.

Présentation :

Prof[®] suspension buvable : Flacon de 100 ml.

Prof[®] 400mg comprimés : Boîte de 30 comprimés pelliculés.

Liste II (Prof[®] 400mg comprimés)


Date de révision de la notice : 01/2012

Décision d'enregistrement :

Prof[®] suspension buvable : 07/04B042/352

Prof[®] 400mg comprimés : 06/04B010/352

Prof[®] est une marque déposée.



Fabricant :

EL KENDI industrie du médicament

Siège : Haouch Kaouch N°2, villa N° 14, Dely Brahim – Alger.

Usine : Z.A. Sidi Abdellah, Zeraïda – Alger.