

Painoxam

Piroxicam

FORME ET PRESENTATION :

Boite de 15 suppositoires à 20 mg.

COMPOSITION :

Piroxicam20 mg.

Excipients : glycérides hémi-synthétiques solides, silice colloïdale hydratée.....q.s.p. un suppositoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTI-INFLAMMATOIRE NON-STEROÏDIEN (AINS).

INDICATIONS :

Traitement symptomatique des affections rhumatismales inflammatoires et dégénératives.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Par voie rectale. Forme réservée exclusivement à l'adulte.

Traitement à long terme des rhumatismes inflammatoires et arthroses :

1 suppositoire à 20 mg par jour de préférence le soir au coucher.

Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des rhumatismes articulaires et des affections post-traumatiques de l'appareil locomoteur :

1 suppositoire à 20 mg par jour de préférence le soir. La dose quotidienne totale de Piroxicam ne doit pas dépasser la dose maximale de 40 mg par jour.

CONTRE INDICATIONS :

- Sujets de moins de 15 ans.
- En cas d'allergie avérée au Piroxicam, la survenue de crise d'asthme a été observée chez certains sujets.
- Antécédents récents de rectites et de rectorragies.
- Ulcère gastro-duodénal en évolution.
- Insuffisance hépatocellulaire.
- Insuffisance rénale sévère.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- En raison de la gravité possible des manifestations gastro-intestinales, notamment chez les malades sous anticoagulants, il est nécessaire de surveiller particulièrement l'apparition de symptômes digestifs. En cas d'hémorragie gastro-intestinale, arrêter immédiatement le traitement.
- Risque de survenue de crise d'asthme.
- En raison de la gravité possible des réactions cutanées, il convient de surveiller l'apparition de prurits, rashes, conjonctivites. Dans ce cas, il convient d'interrompre immédiatement le traitement.
- La prescription du Piroxicam n'est pas recommandée en cas d'affections rhumatologiques ou post-traumatiques spontanément régressives et/ou invalidantes.
- A administrer avec prudence chez les personnes ayant des antécédents digestifs.
- Une surveillance étroite, au début du traitement, du volume de la diurèse et de la fonction rénale est nécessaire chez les insuffisants cardiaques,

hépatiques, rénaux et chez les patients prenant un diurétique ainsi que chez le sujet âgé.
- Il n'y a pas lieu de réduire la dose chez le sujet âgé.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

- Il est déconseillé d'utiliser Piroxicam en cas de grossesse, bien qu'aucun effet tératogène n'ait été observé.
- Il est déconseillé d'utiliser Piroxicam chez les femmes allaitantes (passage du produit dans le lait maternel).

EFFETS INDESIRABLES :

- Effets gastro-intestinaux : nausées, vomissements, pesanteur épigastrique, constipation.
- Effets sur le système nerveux central : étourdissements, somnolence, céphalées, vertiges ainsi qu'un malaise et des bourdonnements d'oreilles ont été observés.
- Réactions d'hypersensibilités d'ordre cutané (prurits, éruption cutanée, rashes) et respiratoire (crise d'asthme).
- Autres : oedèmes, oedèmes des membres inférieurs.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage :

- Transfert immédiat en milieu hospitalier.
- Traitement symptomatique.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 25°C.

LISTE I

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose au danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les seuls experts en médicaments et connaissent leurs bienfaits et risques.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne pas laisser à la portée des enfants

Décision d'enregistrement n° : 06/04B 023/263

Détenteur de la DE : صاحب مقر التسجيل
BIOPHARM, 12, rue Ali Boumendjel, Alger, Algérie
Fabriqué par : صنع من طرف
BIOPHARM, Z. I. Oued Smar, Alger, Algérie
Sous licence من طرف
des laboratoires OPALIA, Tunis, Tunisie

