NIFLUMENE®

Morniflumate *200 mg , 400 mg et 700 mg*

FORME ET PRESENTATION
Suppositoires : boîte de 08

COMPOSITION
Par suppositoire
Morniflumate : 200 mg
Ou 400 mg
Ou 700 mg
Excipient : glycérides hémisynthétiques ..... q.s. p 1suppositoire

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
NIFLUMENE 200 mg et NIFLUMENE 400 mg sont réservés à l'enfant à partir de 6 mois.
NIFLUMENE 700 mg est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.
Ils sont indiqués:
- En traitement de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite rhumatoïde, et de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.
- En traitement symptomatique de courte durée des douleurs aiguës d'arthroses, et de certaines inflammations du pourtour des articulaires tels que tendinites, bursites.
- En traitement de certaines douleurs dues à une inflammation de la gorge, des oreilles ou de la bouche.

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT? (CONTRE-INDICATIONS)
au delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée).
- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoire non stéroïdiens , acide acétylsalicylique (aspirine).
- Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
- Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
- Antécédents d'allergie aux autres constituants du suppositoire.
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution ou récidivant.
- Maladies graves du foie.
- Maladies graves des reins.
- Maladies graves du cœur.
- Inflammation ou saignement récent du rectum (liée à la voie d'administration).
- Nourrisson moins de six mois.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN, notamment autre anti-inflammatoire non stéroïdien, corticostéroïdes ,anticoagulants oraux, aspirine à forte dose, héparine injectable, autres anti-agrégant plaquettaires comme la ticlopidine , lithium, méthotrexate à forte dose, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II
certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), pemetrexed , ciclosporine, tacrolimus

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
votre médecin peut être amené à vous prescrir ce médicament au cours du 1er trimestre.
De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus, ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin et en prise brève.
vous ne devez en aucun cas prendre ce médicament au delà de 5 mois de grossesse.

Allaitement :
ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tout médicament NIFLUMENE 200 mg, 400 mg et 700 mg suppositoires, sont susceptibles d'avoir des effets indésirables.
Il est indispensable d'arrêter immédiatement le traitement et d'avertir votre médecin en cas :
- de réactions allergiques cutanées de type éruption sur la peau, de démangeaisons, fortes réactions de la peau lors d'une exposition au soleil ou aux UV, rarement, des lésions bulleuses (de type ampoules) sur les muqueuses ou la peau,
- de réactions allergiques respiratoires de type crise d'asthme.
- de réactions allergiques générales de type choc allergique.
- d'hémorragies digestives.
- Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE SUR CETTE NOTICE.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES.
Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner vertiges et somnolence.

COMMENT UTILISER NIFLUMENE 200 MG , NIFLUMENE 400 MG ET NIFLUMENE 700 MG SUPPOSITOIRES,
Mode et voie d'administration : voie rectale.
Posologie: elle est fonction de l'indication et de l'âge de l'enfant.
- Age de 6 mois à 30 mois : 1 suppositoire de NIFLUMENE 200 mg, 2 fois par jour.
- Age de 30 mois à 12 ans : 1 suppositoire de NIFLUMENE 400 mg par 10 kg de poids et par jour sans dépasser 3 suppositoires par jour.
- Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 suppositoire de NIFLUMENE 700 mg, 2 fois par jour, soit 1400 mg de morniflumate par 24 heures.

L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de toxicité locale.
Si vous avez pris plus de NIFLUMENE 200 mg, 400 mg ou 700 mg suppositoires que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre votre médicament : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
Conserver NIFLUMENE 200 mg, 400 mg et 700 mg suppositoires entre 15°C et 25°C dans son emballage d'origine.
Ne jamais laisser ce médicament à la portée des enfants.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE
Liste II

DE N° : 09/04B 064/231
06/04B 031/231
09/04B 030/231

Date de mise à jour de la notice : Février 2017.

D.E N° 09/04B 064/231
D.E N° 06/04B 031/231
D.E N° 09/04B 030/231

LABORATOIRES SALEM
Détenteur de la DE, Fabricant , Conditionneur :
LABORATOIRES SALEM – Z.I. 19600EL-EULMA - ALGERIE
www.labosalem.com

Médicaments non utilisés à rapporter en pharmacie
TRIEZ VOS EMBALLAGES
Plaquette plastique vide à jeter
Etui carton vide à recycler

نفلومان®

مورنفلومات 200 مغ ، 400 مغ ، 700 مغ

شكل و تقديم
تحميلات : علبة 08 تحميلات

التركيب: في التحميلة
مورنفلومات ..... 200 مغ
أو 400 مغ
أو 700 مغ
سواغ : غليسيريد نصف تركيبي ..... ك.ك.ل. 1 تحميلة

في أي حالة يستعمل هذا الدواء ؟
يستعمل نفلومان 200 مغ و نفلومان 400 مغ تحميلات عند الأطفال ابتداء من الشهر السادس. يستعمل نفلومان 700 مغ تحميلات عند البالغين والأطفال ابتداء من 12 سنة.

يوصف نفلومان في معالجة الحالات التالية :
- علاج طويل المدى لبعض حالات الالتهابات الرثية المزمنة، التهاب المفصل الفقاري و بعض حالات الفصال المؤلمة و المعجزة .
- علاج قصير المدى لبعض حالات الفصال، رثية المفاصل، التهاب الوتر و التهاب الجراب.
- علاج لبعض الآلام بسبب التهابات الحلق, الأذنين أو الفم.

يمنع استعمال هذا الدواء في الحالات التالية
- فوق 5 أشهر منقضية من الحمل (24 أسبوع منذ احتباس الطمث)
- سوابق حساسية أو الربو بسبب تناول هذا الدواء أو دواء مماثل، خاصة مضادات الالتهاب غير ستيرويدية ، حمض استيل ساليسيليك (أسبرين).
- سوابق نزيف في الجهاز الهضمي او قرحة بسبب علاجات سابقة بمضادات الالتهاب غير ستيرويدية.
- سوابق نزيف في الجهاز الهضمي، نزيف دماغي أو أي نزيف آخر موجود.
- سوابق حساسية لمكونات أخرى للتحميلة.
- أمراض كبدية خطيرة.
- أمراض كلوية خطيرة.
- أمراض قلب خطيرة.
- التهاب أو نزيف حديث للمستقيم (مرتبط بطريقة الاستعمال).
- رضيع أقل من 6 أشهر.

التداخلات الدوائية
من أجل تجنب احتمال تداخلات عدة أدوية يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالعلاج المتبع ، خاصة مضاد التهاب آخر غير ستيرويدي، ستيرويدات قشرية، مضادات التخثر المتناولة عن طريق الفم، الأسبرين بجرعة قوية ،الهبرين بالحقن ، مضادات تخثر اخرى مثل تكلوبدين ،الليثيوم ، ميتوتركسات بجرعات قوية، مثبطات الإنزيم المحول للانجيوتنسين، مدرات البول ، حاصرات مستقبلات بيتا ، مضادات مستقبلات الانجيوتنسين II، بعض مضادات الاكتئاب (مثبطات انتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين) ، بيميتركسيد، سيكلوسبورين ،تاكروليموس.

الحمل و الرضاعة
الحمل : قد يكون طبيبك في حاجة لوصف هذا الدواء أثناء الثلاثي الاول. عند 2,5 إلى 5 اشهر منقضية من الحمل فإنه لا يسمح بأخذ هذا الدواء إلا باستشارة الطبيب و بصفة وجيزة. لا يجب في أي ظرف من الظروف اخذ هذا الدواء. بعد 5 أشهر من الحمل و ما فوق

الرضاعة : ينتقل هذا الدواء في حليب الام، من باب الحيطة و الحذر يوصى بعدم استخدامه أثناء فترة الإرضاع. اطلبوا استشارة طبيبكم أو الصيدلي.

ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة غير المرغوب فيها ؟
ككل دواء نفلومان 200 مغ، نفلومان 400 مغ و نفلومان 700 مغ تحميلات يمكن أن يكون له تأثيرات غير مرغوب فيها تتطلب التوقيف الفوري للعلاج و تنبيه الطبيب في حالة حدوث :
- حساسية جلدية من نوع طفح جلدي، حكة، تأثر شديد للجلد عند التعرض للشمس أو للأشعة فوق البنفسجية، نادرا جرح فقاعي على مستوى الجلد و الأنسجة المخاطية.
- حساسية تنفسية من نوع أزمة الربو.
- تأثيرات عامة من نوع صدمة حساسية.
- نزيف هضمي.
- استثنائيا، لوحظت انتانات جلدية خطيرة في حال وجود مرض الجدري.

أبلغوا طبيبكم أو الصيدلي بالتأثيرات غير المرغوب فيها و المزعجة التي لم تذكر في هذه الوصفة.

قيادة المركبات و استعمال الآلات
نادرا قد يتسبب هذا الدواء في دوار و نعاس.

كيف يستعمل نفلومان 200 مغ , نفلومان 400 مغ و نفلومان 700 مغ تحميلات؟
كيفية و طريق الاستعمال: عن طريق الشرج مقادير الاستعمال: حسب التعليمات و سن الطفل.
- من 6 أشهر إلى 30 شهر : تحميلة من نفلومان 200 مغ مرتين في اليوم.
- من 30 شهر إلى 12 سنة : تحميلة من نفلومان 400 مغ لكل 10 كغ من الوزن مرة واحدة في اليوم دون ان تتعدى 3 تحميلات في اليوم
- الكبار و الأطفال الأكبر من 12 سنة : تحميلة من نفلومان 700 مغ مرتين في اليوم أي ما يعادل 1400 مغ من مرنفلومات خلال 24 ساعة.

إن استعمال الطريق الشرجي يجب أن يكون قصير المدى بسبب احتمال تسمم موضعي. إذا استعملت نفلومان 200 مغ أو نفلومان 400 مغ أو نفلومان 700 مغ تحميلات أكثر من اللازم, عليك أن تبلغ طبيبك أو الصيدلي فورا.

إذا نسيت استعمال نفلومان 200 مغ و نفلومان 400 مغ و نفلومان 700 مغ تحميلات: لا تضاعف الجرعة لتعويض ما نسيت.

شروط الحفظ
لا تتجاوز المدة المحددة للاستعمال التي تظهر على التغليف الخارجي. أحفظوا نفلومان 200 مغ, نفلومان 400 مغ و نفلومان 700 مغ تحميلات بين 15°م و 25°م في التعبئة الأصلية.

لا تترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

شروط الاستطباب
قائمة II

مقرر التسجيل رقم : 09/04B 064/231
06/04B 031/231
09/04B 030/231
تاريخ تحديث النشرة : فيفري 2017

D.E N° 09/04B 030/231
D.E N° 06/04B 031/231
D.E N° 09/04B 064/231

مخابر سالم
حامل مقرر التسجيل, مصنع, معبئ :
مخابر سالم – م.ص. 19600 العلمة – الجزائر
www.labosalem.com

صندوق من الورق المقوى قابل لإعادة تدوير
لوحة من البلاستيك الفارغة للرمي
فرز التعبئة والتغليف الخاصة بك
الأدوية غير المستخدمة ترد للصيدلية