Peridium®

Domperidone

Comprimés sécables

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Forme et présentation
Boite de 30 Comprimés sécables 10mg

Composition : par comprimé sécable

Principe actif : Domperidone (DCI).....10mg

Excipients : lactose monohydraté, amidon de maïs ,cellulose microcristalline, polyvidone K25, laurylsulfate de sodium, glycolate amidon sodique, stéarate de magnésium

Excipients à effet notoire :

Lactose monohydraté....51mg/ Comprimé

Classe pharmaco-thérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale, antiémétique

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Adulte et enfant : Soulagement des symptômes de type nausées et vomissements.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale
il est recommandé de prendre Peridium avant les repas
La forme comprimé est réservée à l'adulte
Les enfants seront traités préférentiellement avec la forme suspension.

Adulte et adolescent (de plus de 12 ans et plus de 35kg):

1 comprimé jusqu'à 3 fois pas jour, la dose quotidienne maximale étant de 30mg par jour

La durée de traitement ne doit généralement pas dépasser une semaine

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité connue à la dompéridone ou à l'un des excipients du Peridium
- Tumeur hypophysaire à prolactine (prolactinome)

Peridium ne doit pas être utilisé lorsque la stimulation de la motricité gastrique peut s'avérer nocive : hémorragie gastro-intestinale, obstruction mécanique ou perforation.

- Insuffisance hépatique modérée ou sévère
- Pathologies qui affectent la conduction cardiaque
- Prise concomitante de médicaments qui allongent l'intervalle QT ou d'inhibiteurs puissants du cytochrome P450 3A4 (voir interactions)

En cas de doute il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Peridium ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

EFFETS INDÉSIRABLES : Très rares

- **Réactions allergiques** : anaphylaxie, choc anaphylactique, réaction anaphylactique, urticaire et oedème de Quincke
- **Troubles du système endocrinien** : augmentation des taux de prolactine
- **Troubles du système nerveux** : effets secondaires extrapyramidaux
- **Affections cardiaques** : arythmie ventriculaire.
- **Troubles gastro-intestinaux** : troubles du système digestif, y compris des crampes intestinales, diarrhée.
- **Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés** : prurit, rash.
- **Troubles de la reproduction et des glandes mammaires** : galactorrhée, gynécomastie, aménorrhée.

Signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

EFFET SUR LA CONDUITE / L'UTILISATION DES MACHINES

Peridium n'altère pas (ou de façon négligeable) la capacité à conduire ou à utiliser des machines.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE

- Intolérance au lactose, galactosémie, malabsorption du glucose ou du galactose.
- Troubles hépatiques.
- Insuffisance rénale.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- L'association avec un dérivé anti cholinergique est déconseillée.
- La prise concomitante de kétoconazole par voie orale, d'érythromycine ou d'autres inhibiteurs puissants du CYP3A4.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien

SURDOSAGE

Symptômes
L'endormissement, la désorientation et des réactions extrapyramidales notamment chez les enfants.
Traitement

- Il n'existe pas d'antidote spécifique à la dompéridone.
- Un lavage gastrique, l'administration de charbon actif, une surveillance médicale étroite et un traitement symptomatique sont recommandés.
- Les médicaments anti cholinergiques ou anti parkinsoniens peuvent être utiles pour contrôler les réactions extrapyramidales.

CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Liste II

DE .N° : 065/10F046/03/10

Date de révision de la notice : JUILLET 2010

Fabricant et Détenteur de la DE:
GENERICLAB. BP73 voie C. Zone Industrielle.
Rouïba. Alger. Algérie.

Genericlab