

AMOXICILLINE EG[®]

Amoxicilline

Liste I

Poudre pour suspension buvable

L'amoxicilline est un antibiotique antibactérien de la famille des beta-lactamines du groupe des amino-pénicillines.

Composition et Présentation :

Amoxicilline EG 125 mg / 5 ml :

la substance active : Amoxicilline trihydratée quantité correspondante à amoxicilline anhydre.....125 mg.

Amoxicilline EG 250 mg / 5 ml :

la substance active : Amoxicilline trihydratée quantité correspondante à amoxicilline anhydre.....250 mg.

Amoxicilline EG 500 mg / 5 ml :

la substance active : Amoxicilline trihydratée quantité correspondante à amoxicilline anhydre.....500 mg.

Excipients: le benzoate de sodium, le citrate de sodium anhydre, l'arôme cerise, l'acide citrique anhydre, le saccharose.

Poudre pour suspension buvable, Flacon à 60 ml, soit 12 cuillères de mesure de 5 ml.

Indications: il est indiqué dans le traitement des infections bactériennes à germes sensibles, dans leurs manifestations:

- Respiratoire –ORL- Urogénital
- Digestive et biliaire –Stomatologique chez l'adulte dans le traitement de certains ulcères de l'estomac ou du duodénum.

Contres indications:

- Allergie aux pénicillines ou aux céphalosporines.
- Mononucléose infectieuse (risque accru d'effets indésirables cutanés).
- Ce médicament est généralement déconseillé en association avec le méthotrexate.

Précautions d'emploi:

- Insuffisance rénale: posologie adaptée.
- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaisons.....) doit être signalée.
- Boire abondamment pendant la durée du traitement.
- Ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose en raison de la présence de sorbitol, saccharose, glucose (maladies métaboliques).
- Ce médicament contient du saccharose en tenir compte en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète .
- Il contient du sodium, n'en tenir compte que chez les enfant suivant un régime sans sel strict.

Interactions médicamenteuses et autres indications :

-Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments et surtout le méthotéxate, aviser votre

médecin ou votre pharmacien en cas de prise d'autres médicaments.

Posologie et mode d'administration:

Voie orale

Pour l'adulte et dans certains cas chez l'enfant (posologies importantes, grands enfants), d'autres présentations d'amoxicilline sont plus adaptées.

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

La posologie varie selon la pathologie qui est traitée.

Chez l'adulte de 1 g à 6 g/24 heures.

Chez l'enfant de 25 mg/kg à 150 mg/kg / 24 heures.

Les doses doivent être modifiées en cas d'insuffisance rénale.

Préparation de la suspension :

1-remplir le flacon d'eau non gazeuse jusqu'au trait.

2-agiter jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène.

Si nécessaire, compléter à nouveau d'eau jusqu'au trait et agiter.

Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

Laver la cuillère-mesure après utilisation.

Ce médicament peut être pris indifféremment à jeûn, avant, pendant ou après les repas.

Effets indésirables:

- Allergies pouvant se manifester de façon plus ou moins grave.
- Troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhées, etc.
- Augmentation modérée et transitoire des enzymes du foie (Transaminases).
- Anémie, baisse des globules blancs et des plaquettes.
- Atteinte rénale.

Aviser votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse et allaitement: l'allaitement est possible en cas d'administration de ce médicament, et en cas de besoin il peut être pris pendant la grossesse, il est toujours conseillé de signaler la grossesse et l'allaitement à votre médecin.

Conservation: après reconstitution, le médicament peut être conservé **7 jours maximum à une température ne dépassant pas 25° C, ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.**

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur la boîte.

Fabriqué par : Les laboratoires HUP.P PHARMA
Z.I.le palma N°50 CONSTANTINE - ALGÉRIE