Notice : information de l'utilisateur

Cerazette®,

75 microgrammes,
Désogestrel
28 comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même en cas de symptômes identiques.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable mentionnés à la rubrique 4, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Cerazette et dans quel cas est-il utilisé
2. Dans quel cas, vous ne pouvez pas prendre ce médicament ou les cas où vous devriez être extrêmement prudent
3. Comment prendre Cerazette
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Cerazette
6. Contenu de l'emballage et Autres informations

1. Qu'est-ce que Cerazette et dans quel cas est-il utilisé

Cerazette s'utilise pour prévenir une grossesse. Cerazette contient une faible quantité d'une seule hormone sexuelle féminine, **le désogestrel**, un progestatif.
C'est pourquoi Cerazette est appelée pilule progestative (PP). Contrairement aux pilules combinées, la PP ne contient pas d'hormone œstrogène en plus du progestatif.

La plupart des pilules progestatives agissent principalement en empêchant la pénétration des spermatozoïdes dans la matrice mais, n'inhibent pas toujours l'ovulation, ce qui est l'action principale des pilules combinées. Cerazette se distingue des autres pilules contenant uniquement un progestatif par le fait que son dosage est suffisamment élevé pour inhiber dans la majorité des cas la maturation de l'ovule. Cerazette est de ce fait très fiable.

Contrairement aux pilules combinées, Cerazette peut être utilisé par les femmes qui ne supportent pas les œstrogènes, ainsi que par les femmes qui allaitent. Un inconvénient de Cerazette est que des saignements vaginaux peuvent survenir à intervalles irréguliers. Il est également possible que ces saignements demeurent totalement absents.

2. Dans quel cas, vous ne pouvez pas prendre ce médicament ou les cas où vous devriez être extrêmement prudent

Au même titre que les autres contraceptifs hormonaux, Cerazette ne protège pas contre l'infection par le VIH (SIDA) ni contre toutes autres maladies sexuellement transmissibles (MST).

Ne prenez jamais Cerazette

- Si vous êtes allergique au désogestrel ou à l'un des autres composants de Cerazette (mentionnés dans la rubrique 6)
- Si vous souffrez de thrombose. Une thrombose est la formation d'un caillot de sang dans un vaisseau sanguin [par exemple au niveau d'une jambe (thrombose veineuse profonde) ou des poumons (embolie pulmonaire)].
- Si vous avez ou avez eu la jaunisse (jaunissement de la peau) ou une maladie grave du foie et que votre fonction hépatique n'est toujours pas normale.
- Si vous avez ou suspecté d'avoir un cancer sensible aux hormones sexuelles, comme certains types de cancers du sein.
- Si vous présentez des saignements vaginaux inexpliqués.

Avertissez votre médecin avant de commencer à prendre Cerazette si l'une de ces situations s'applique à vous. Votre médecin vous conseillera alors peut-être une méthode contraceptive non hormonale.
Consultez immédiatement votre médecin si l'une de ces situations apparaît pour la première fois alors que vous utilisez Cerazette.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Cerazette, si :

cancer du sein en plus des 4 cas normalement diagnostiqués parmi cette classe d'âge. De même, sur 10 000 femmes qui prennent la pilule pendant 5 ans mais arrêtent à l'âge de 30 ans, on diagnostiquerait 5 cas supplémentaires de cancer du sein en plus des 44 cas normalement diagnostiqués. Sur 10 000 femmes qui prennent la pilule pendant 5 ans mais arrêtent à l'âge de 40 ans, on diagnostiquerait 20 cas supplémentaires de cancer du sein en plus des 160 cas normalement diagnostiqués.

On pense que le risque de cancer du sein chez les utilisatrices de pilules contenant uniquement un progestatif, comme Cerazette, est semblable au risque chez les femmes qui utilisent la pilule, mais l'évidence est moins concluante.

Les cas de cancer du sein diagnostiqués chez les utilisatrices de la pilule sont souvent à un stade moins avancé que chez les non-utilisatrices. On ignore si cette différence en termes de cancer du sein est due à la pilule.
Il est possible que les femmes fussent examinées plus souvent de sorte que le cancer du sein a été détecté plus tôt.

Thrombose

Contactez immédiatement votre médecin si vous constatez subitement des symptômes susceptibles d'indiquer une thrombose (voir également « Contrôles réguliers »).

Une thrombose est la formation d'un caillot de sang susceptible d'obstruer un vaisseau sanguin. Une thrombose survient parfois au niveau d'une veine profonde de la jambe (thrombose veineuse profonde). Si le caillot se détache, il peut parvenir dans les artères des poumons et provoquer à cet endroit l'obstruction d'un vaisseau sanguin (embolie pulmonaire). Cela peut dans certains cas avoir une issue fatale. La thrombose veineuse profonde est rare.
Elle peut survenir tant chez les utilisatrices de la pilule que chez les non-utilisatrices. Elle peut également survenir durant une grossesse. Le risque de thrombose est plus élevé chez les utilisatrices de la pilule que chez les non-utilisatrices. Le risque associé aux pilules contenant uniquement un progestatif, comme Cerazette, serait plus faible que chez les utilisatrices d'une pilule combinée contenant également des œstrogènes.

Enfants et adolescents

Aucune donnée clinique sur la sécurité et l'efficacité n'est disponible chez les adolescentes de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Cerazette

Si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament ou des produits à base de plantes, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Certains médicaments peuvent réduire l'efficacité de Cerazette. C'est notamment le cas des médicaments destinés au traitement des affections suivantes :

- épilepsie (par exemple primidone, phénytoïne, carbamazépine, oxcarbazépine, felbamate et phénobarbital, topiramate).
- tuberculose (par exemple rifampicine, rifabutine).
- infection par le VIH (par exemple ritonavir, nelfinavir) ou autres maladies infectieuses (par exemple griséofulvine).
- troubles gastro-intestinaux (charbon actif).
- dépression légère (millepertuis, un produit phytopharmaceutique).

Votre médecin vous indiquera s'il est nécessaire d'utiliser un moyen contraceptif supplémentaire et pendant combien de temps.
Cerazette peut également influencer l'activité d'autres médicaments et en renforcer les effets (par exemple cyclosporine) ou les atténuer.

Grossesse et allaitement

Grossesse

N'utilisez pas Cerazette si vous êtes enceinte ou pensez l'être.

Allaitement

Cerazette peut être utilisé pendant l'allaitement. Cerazette est dépourvu d'effet sur la production ou la qualité du lait maternel. Une faible quantité de la substance active de Cerazette passe toutefois dans le lait maternel.
La santé des enfants ayant été allaités pendant 7 mois et dont les mères utilisaient Cerazette a été étudiée pendant 2,5 ans. Aucun effet sur la croissance ou le développement de ces enfants n'a été observé.
Si vous allaitez et souhaitez utiliser Cerazette, demandez conseil à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'existe aucune donnée indiquant que l'utilisation de Cerazette affecte la concentration et la capacité de réaction.

Cerazette contient du lactose

Cerazette contient du lactose. Contactez votre médecin avant de prendre Cerazette si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres.

médicament ou les cas où vous devriez être extrêmement prudent

Au même titre que les autres contraceptifs hormonaux, Cerazette ne protège pas contre l'infection par le VIH (SIDA) ni contre toutes autres maladies sexuellement transmissibles (MST).

Ne prenez jamais Cerazette

- Si vous êtes allergique au désogestrel ou à l'un des autres composants de Cerazette (mentionnés dans la rubrique 6)
- Si vous souffrez de thrombose. Une thrombose est la formation d'un caillot de sang dans un vaisseau sanguin [par exemple au niveau d'une jambe (thrombose veineuse profonde) ou des poumons (embolie pulmonaire)].
- Si vous avez ou avez eu la jaunisse (jaunissement de la peau) ou une maladie grave du foie et que votre fonction hépatique n'est toujours pas normale.
- Si vous avez ou suspecté d'avoir un cancer sensible aux hormones sexuelles, comme certains types de cancers du sein.
- Si vous présentez des saignements vaginaux inexpliqués.

Avertissez votre médecin avant de commencer à prendre Cerazette si l'une de ces situations s'applique à vous. Votre médecin vous conseillera alors peut-être une méthode contraceptive non hormonale.
Consultez immédiatement votre médecin si l'une de ces situations apparaît pour la première fois alors que vous utilisez Cerazette.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Cerazette, si :

- vous avez ou avez eu un cancer du sein.
- vous avez un cancer du foie car il n'est pas possible d'exclure un éventuel effet de Cerazette.
- vous avez eu une thrombose.
- vous êtes diabétique.
- vous souffrez d'épilepsie (voir rubrique « Autres médicaments et Cerazette »).
- vous souffrez de tuberculose (voir rubrique « Autres médicaments et Cerazette »).
- vous avez une tension artérielle élevée.
- vous avez ou avez eu un chloasma (taches pigmentaires de teinte jaune-brun également appelées « taches de grossesse », apparaissant principalement sur le visage); en pareil cas, il convient d'éviter toute exposition à la lumière solaire directe ou aux rayons ultraviolets.

Si vous utilisez Cerazette et que vous êtes atteinte de l'une de ces maladies, une surveillance plus attentive peut s'avérer nécessaire. Votre médecin vous expliquera ce que vous devez faire.

Cancer du sein

Il est important de contrôler régulièrement vos seins et de consulter votre médecin si vous constatez une grosseur dans votre poitrine.

Chez les femmes qui prennent la pilule, on constate une incidence de cancer du sein un peu plus élevée que chez les non-utilisatrices du même âge. Après l'arrêt de la pilule, ce risque diminue lentement, de telle sorte que 10 ans après l'arrêt, il est identique à celui des femmes n'ayant jamais pris la pilule. Le cancer du sein ne survient que rarement avant l'âge de 40 ans mais le risque augmente avec l'âge. C'est pourquoi le nombre de cas supplémentaires de cancer du sein diagnostiqués est plus élevé parmi les femmes qui continuent à prendre la pilule jusqu'à un âge plus avancé. La durée d'utilisation de la pilule est un facteur moins important.

Sur 10 000 femmes qui prennent la pilule pendant 5 ans mais arrêtent à l'âge de 20 ans, on diagnostiquerait jusqu'à 10 ans après l'arrêt moins de 1 cas supplémentaire de

maladies infectieuses (par exemple gastroentérite).

- troubles gastro-intestinaux (charbon actif).
- dépression légère (millepertuis, un produit phytopharmaceutique).

Votre médecin vous indiquera s'il est nécessaire d'utiliser un moyen contraceptif supplémentaire et pendant combien de temps.
Cerazette peut également influencer l'activité d'autres médicaments et en renforcer les effets (par exemple cyclosporine) ou les atténuer.

Grossesse et allaitement

Grossesse

N'utilisez pas Cerazette si vous êtes enceinte ou pensez l'être.

Allaitement

Cerazette peut être utilisé pendant l'allaitement. Cerazette est dépourvu d'effet sur la production ou la qualité du lait maternel. Une faible quantité de la substance active de Cerazette passe toutefois dans le lait maternel.
La santé des enfants ayant été allaités pendant 7 mois et dont les mères utilisaient Cerazette a été étudiée pendant 2,5 ans. Aucun effet sur la croissance ou le développement de ces enfants n'a été observé.
Si vous allaitez et souhaitez utiliser Cerazette, demandez conseil à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'existe aucune donnée indiquant que l'utilisation de Cerazette affecte la concentration et la capacité de réaction.

Cerazette contient du lactose

Cerazette contient du lactose. Contactez votre médecin avant de prendre Cerazette si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres.

Contrôles réguliers

Quand vous utilisez Cerazette, votre médecin vous demandera de revenir pour des examens médicaux périodiques. En général, la fréquence et la nature de ces examens médicaux périodiques dépendra de votre situation personnelle.

Contactez votre médecin dès que possible dans les cas suivants :

- en cas de douleur sévère ou d'un gonflement dans l'une de vos jambes, de douleurs inexpliquées dans la poitrine, d'essoufflement, de toux inhabituelle, surtout si elle est associée à des vomissements de sang (ce qui peut indiquer une **thrombose**).
- en cas de douleur abdominale soudaine et intense ou d'ictère (ce qui peut indiquer **des problèmes hépatiques**).
- en cas de grosseur au niveau d'un sein (ce qui peut indiquer un **cancer du sein**).
- en cas de douleur soudaine et intense au niveau de l'abdomen ou dans la région de l'estomac (ce qui peut indiquer une **grossesse extra-utérine**).
- vous devez rester alitée quelques temps ou vous êtes incapable de marcher ou vous devez subir une opération (consultez votre médecin au moins quatre semaines à l'avance); en cas d'hémorragie vaginale inexpliquée, importante et persistante.
- si vous pensez que vous pourriez **être enceinte.**

3. Comment prendre Cerazette

Quand et comment prendre les comprimés ?

La plaquette de Cerazette contient 28 comprimés. Sur la face avant de la plaquette, entre les comprimés, il y a de petites flèches. Sur la pellicule située à l'arrière de la plaquette sont indiqués les jours de la semaine. A chaque jour correspond un comprimé.

Commencez chaque nouvelle plaquette en prenant un comprimé de la rangée supérieure. Veillez à prendre le bon comprimé.
Par exemple, si vous commencez un mercredi, prenez le comprimé de la rangée supérieure pour lequel est indiqué (à l'arrière) MER. Suivez le sens des flèches et prenez chaque jour un comprimé jusqu'à ce que la plaquette soit vide. En examinant l'arrière de la plaquette, vous pouvez aisément contrôler si vous avez déjà pris votre comprimé quotidien.

Prenez les comprimés chaque jour à peu près à la même heure, en les avalant avec un peu d'eau et sans les mâcher. Pendant l'utilisation de Cerazette, il est possible que vous ayez des saignements mais vous devez continuer à prendre vos comprimés comme d'habitude. Lorsqu'une plaquette est vide, entamez immédiatement une nouvelle plaquette de Cerazette le lendemain, donc sans interruption et sans attendre de saignements.

Quand débuter la première plaquette de Cerazette ?

- *Vous n'utilisiez pas de pilule contraceptive le mois précédent.* Attendez vos règles pour commencer. Prenez le premier comprimé de Cerazette le premier jour de vos règles. Vous ne devez pas utiliser de précautions contraceptives supplémentaires. Vous pouvez également débuter entre le 2e et le 5e jour de votre cycle, mais dans ce cas, vous devez veiller à utiliser une méthode contraceptive supplémentaire (méthode de barrière) au cours des 7 premiers jours de prise des comprimés.
- *Vous utilisiez une pilule combinée, un anneau vaginal ou un patch transdermique.*
  Commencez à prendre Cerazette le lendemain de la prise du dernier comprimé de la plaquette de votre pilule actuelle ou le jour du retrait de l'anneau vaginal ou du patch transdermique (donc pas d'intervalle sans pilule, anneau ou patch). Si la plaquette de votre pilule actuelle contient des comprimés placebo (donc sans hormones), vous devez commencer à prendre Cerazette le lendemain de la prise du dernier comprimé actif (en cas de doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de quel comprimé il s'agit). Si vous respectez ces instructions, il n'est pas nécessaire d'utiliser un moyen contraceptif supplémentaire.

  Vous pouvez également débuter le jour qui suit la période sans comprimés, anneau ou patch ou la période de prise des comprimés placebo de votre contraceptif actuel. Si vous respectez ces instructions, assurez-vous d'utiliser un moyen contraceptif supplémentaire (méthode de barrière) au cours des 7 premiers jours de prise des comprimés.

  Vous passez d'une autre pilule progestative (PP) à Cerazette.
  Vous pouvez arrêter votre pilule progestative et commencer à prendre Cerazette tout de suite après sans avoir à utiliser un moyen contraceptif supplémentaire.
- *Vous passez d'une préparation injectable, d'un implant contraceptif ou d'un stérilet libérant un progestatif.*
  Vous pouvez commencer à prendre Cerazette le jour où vous devriez normalement recevoir l'injection suivante ou le jour du retrait de l'implant ou du stérilet. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de moyen contraceptif supplémentaire.
- *Après un accouchement*
  Commencez à prendre Cerazette entre le 21e et le 28e jour après l'accouchement. Si vous débutez plus tardivement, vous devez utiliser un moyen contraceptif supplémentaire (méthode de barrière) pendant les 7 premiers jours de prise des comprimés. Si vous avez eu des rapports sexuels, il est nécessaire d'exclure une grossesse avant de commencer à prendre Cerazette. Des informations supplémentaires pour les femmes qui allaitent figurent à la rubrique 2 « Grossesse et allaitement ». Votre médecin peut également vous conseiller.
- *Après une fausse couche ou une interruption de grossesse*
  Conformez-vous aux recommandations de votre médecin.

Si vous oubliez de prendre Cerazette

- Si vous avez **moins de 12 heures de retard** pour la prise d'un comprimé, la fiabilité de Cerazette n'est pas diminuée. Prenez le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte et continuez à prendre les comprimés suivants au moment habituel.
- Si vous avez **plus de 12 heures de retard** pour la prise d'un comprimé, la fiabilité de Cerazette peut se trouver diminuée. Plus vous avez oublié de comprimés consécutifs, plus important est le risque de réduction de l'efficacité contraceptive. Prenez le dernier comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte et continuez à prendre les comprimés suivants au moment habituel. Utilisez également une méthode contraceptive supplémentaire (méthode de barrière) pendant les 7 jours suivants de la prise des comprimés. Si vous avez oublié de prendre un ou plusieurs comprimés au cours de la première semaine de la prise des comprimés et si vous avez eu des rapports sexuels dans la semaine précédant l'oubli, vous devez tenir compte de la possibilité d'une grossesse. Demandez conseil à votre médecin.

Que faire en cas de troubles gastro-intestinaux (par exemple vomissements ou diarrhée sévère)

Suivez les mêmes recommandations que celles spécifiées ci-dessus en cas d'oubli de comprimés. Si vous vomissez ou vous avez pris du charbon actif dans les 3 à 4 heures qui suivent la prise d'un comprimé, ou bien vous souffrez de diarrhée sévère, il est possible que la substance active n'ait pas été totalement absorbée par votre organisme.

Les utilisatrices de Cerazette ont signalé les effets indésirables suivants :

Fréquents (survenant chez plus de 1 utilisatrice sur 100) :	Peu fréquents (survenant chez plus de 1 utilisatrice sur 1 000 mais chez moins de 1 utilisatrice sur 100) :	Rares (survenant chez moins de 1 utilisatrice sur 1 000) :
• changement de l'humeur, état dépressif, diminution de la libido • maux de tête • nausées • acné • douleurs mammaires, règles irrégulières ou absence de règles • augmentation de poids	• infection vaginale • irritation oculaire lors du port de lentilles de contact • vomissements • chute des cheveux • menstruations douloureuses, kyste ovarien • fatigue	• éruption cutanée, formation de vésicules (urticaire), tuméfaction douloureuse de couleur rouge-bleu de la peau (érythème noueux) (ce sont des affections de la peau)

Outre ces effets indésirables, un écoulement peut également apparaître au niveau des mamelons.
Prenez immédiatement contact avec votre médecin si vous présentez des symptômes d'angio-œdème tels que gonflement du visage, de la langue ou de la gorge; difficultés à avaler ou urticaire et difficultés à respirer.

Déclaration des effets indésirables :
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Cerazette

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.
Il n'y a pas de conditions particulières de conservation pour ce médicament. Conserver la plaquette thermoformée dans le sachet d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Durée de conservation après ouverture du sachet: 1 mois.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Cerazette

- La substance active est le désogestrel (75 microgrammes).
- Les autres composants sont dioxyde de silicium colloïdal anhydre, mélange racémique d'α-tocophérol, amidon de maïs, polyvinylpyrrolidone, acide stéarique, hypromellose, macrogol 400, talc, dioxyde de titane (E171), lactose monohydraté (voir également rubrique 2 « Cerazette contient du lactose »).

Qu'est-ce que Cerazette et contenu de l'emballage extérieur

Une plaquette thermoformée de Cerazette contient 28 comprimés pelliculés blancs, ronds. Les comprimés portent sur une face la mention KV et, sous celle-ci, le chiffre 2 et sur l'autre face, la mention ORGANON*. Chaque boîte en carton contient 1 plaquette thermoformée conditionnée individuellement dans des sachets.

Détenteur de la Décision d'enregistrement :
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Pays-Bas.

à la rubrique 2 « Grossesse et allaitement ». Votre médecin peut également vous conseiller.

- *Après une fausse couche ou une interruption de grossesse*
  Conformez-vous aux recommandations de votre médecin.

Si vous oubliez de prendre Cerazette

- Si vous avez **moins de 12 heures de retard** pour la prise d'un comprimé, la fiabilité de Cerazette n'est pas diminuée. Prenez le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte et continuez à prendre les comprimés suivants au moment habituel.
- Si vous avez **plus de 12 heures de retard** pour la prise d'un comprimé, la fiabilité de Cerazette peut se trouver diminuée. Plus vous avez oublié de comprimés consécutifs, plus important est le risque de réduction de l'efficacité contraceptive. Prenez le dernier comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte et continuez à prendre les comprimés suivants au moment habituel. Utilisez également une méthode contraceptive supplémentaire (méthode de barrière) pendant les 7 jours suivants de la prise des comprimés. Si vous avez oublié de prendre un ou plusieurs comprimés au cours de la première semaine de la prise des comprimés et si vous avez eu des rapports sexuels dans la semaine précédant l'oubli, vous devez tenir compte de la possibilité d'une grossesse. Demandez conseil à votre médecin.

Que faire en cas de troubles gastro-intestinaux (par exemple vomissements ou diarrhée sévère)

Suivez les mêmes recommandations que celles spécifiées ci-dessus en cas d'oubli de comprimés. Si vous vomissez ou vous avez pris du charbon actif dans les 3 à 4 heures qui suivent la prise d'un comprimé, ou bien vous souffrez de diarrhée sévère, il est possible que la substance active n'ait pas été totalement absorbée par votre organisme.

Si vous avez pris plus de Cerazette que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Cerazette, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou votre pharmacien. Il n'y a pas eu de rapports d'effets néfastes sérieux suite à la prise d'un trop grand nombre de comprimés de Cerazette en une fois. Les symptômes qui peuvent apparaître sont des nausées, des vomissements et, chez les jeunes filles, des saignements vaginaux légers. Demandez l'avis de votre médecin.

Si vous arrêtez de prendre Cerazette

Vous pouvez cesser de prendre Cerazette lorsque vous le souhaitez. A partir du jour où vous arrêtez, vous n'êtes plus protégée contre une grossesse.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables sérieux associés à l'utilisation de Cerazette sont décrits dans les paragraphes ''Cancer du sein" et ''Thrombose" dans la rubrique 2 "Dans quel cas, vous ne pouvez pas prendre ce médicament ou les cas où vous devriez être extrêmement prudent". Pour plus d'informations veuillez lire cette rubrique et, si nécessaire, consultez immédiatement votre médecin.
Il est possible que vous présentiez au cours de l'utilisation de Cerazette de légers saignements vaginaux à intervalles irréguliers. Ceux-ci peuvent se limiter à quelques gouttes ou être des pertes de sang plus importantes, ressemblant à un léger saignement menstruel et nécessitant l'utilisation d'une protection. Il est également possible que les saignements demeurent totalement absents. Des saignements irréguliers ne sont pas une indication d'une moins bonne protection contre une grossesse. En général, vous ne devez rien faire de spécial et pouvez continuer à prendre normalement Cerazette. Cependant, si la perte de sang est importante ou persiste longtemps, vous devez consulter votre médecin.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.
Il n'y a pas de conditions particulières de conservation pour ce médicament. Conserver la plaquette thermoformée dans le sachet d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Durée de conservation après ouverture du sachet: 1 mois.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Cerazette

- La substance active est le désogestrel (75 microgrammes).
- Les autres composants sont dioxyde de silicium colloïdal anhydre, mélange racémique d'α-tocophérol, amidon de maïs, polyvinylpyrrolidone, acide stéarique, hypromellose, macrogol 400, talc, dioxyde de titane (E171), lactose monohydraté (voir également rubrique 2 « Cerazette contient du lactose »).

Qu'est-ce que Cerazette et contenu de l'emballage extérieur

Une plaquette thermoformée de Cerazette contient 28 comprimés pelliculés blancs, ronds. Les comprimés portent sur une face la mention KV et, sous celle-ci, le chiffre 2 et sur l'autre face, la mention ORGANON*. Chaque boîte en carton contient 1 plaquette thermoformée conditionnée individuellement dans des sachets.

Détenteur de la Décision d'enregistrement :
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Pays-Bas.
Fabricant, Conditionneur, Libérateur des lots:
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Pays-Bas.
D.E N° : 15/ 07/11 H 072 /005

Liste I : uniquement sur ordonnance.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Avril 2015.

Organon