

# AMOXYPEN®

## Amoxicilline dispersible

### Formes et présentations :

Amoxypen® 1 g : comprimé dispersible ; boîte de 6, 14, 16.

Amoxypen® 500 mg : comprimé dispersible ; boîte de 12.

Amoxypen® 250 mg : comprimé dispersible ; boîte de 12.

### Compositions :

Amoxicilline trihydrate (DCI)

Excipients ..... QSP ..... 1 cp

Excipient à effet notoire : Aspartam.

### Indications thérapeutiques : Ce médicament est utilisé dans les cas suivants :

C'est un antibiotique qui appartient à la famille des pénicillines à spectre élargi. C'est -à- dire actives sur un plus grand nombre de germes que la pénicilline simple.

Il est utilisé dans le traitement de diverses maladies infectieuses, notamment celles des poumons, des bronches, du nez, de la gorge ou des oreilles, du sang, de l'appareil digestif ou urinaire, des voies génitales, des gencives et des dents. Il est également utilisé dans le cadre de l'éradication d'*Helicobacter pylori* (responsable d'ulcères gastroduodénaux récidivants), dans la maladie de Lyme et dans la prévention de l'endocardite bactérienne.

### CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie aux pénicillines.

- Mononucléose infectieuse.

- Phénylcétonurie

- Ce médicament ne peut être utilisé qu'après avis médical en cas d'allergie aux céphalosporines. (Risque d'allergie croisée dans 5 à 10 % des cas).

### EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Mise en garde et précautions d'emploi :

Lorsqu'une manifestation allergique survient en cours du traitement, elle doit être signalée immédiatement à un médecin.

- Si à l'occasion d'un traitement antibiotique vous avez

présenté une réaction allergique urticaire cutanée,

démangeaison, œdème de Quincke, prévenir alors le médecin

avant d'utiliser ce médicament.

- Si vous êtes insuffisant rénal prévenir alors le médecin.

- Si les examens suivants vous sont prescrits : Test de

Coombs, Glycémies, Protides totaux sériques, recherche de

glucose dans les urines, prévenir votre médecin, car

l'Amoxicilline peut fausser d'analyses biologique.

### EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Interactions médicamenteuses :

Ce médicament peut interagir avec les médicaments contenant du METHOTREXATE.

Informez par ailleurs votre médecin si vous prenez un médicament contenant de l'ALLOPURINOL.

### Grossesse et allaitement :

Les études scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation chez la femme enceinte. Seul votre médecin peut apprécier la nécessité du traitement et son risque pendant la grossesse.

Ce médicament passe dans le lait maternel ; la poursuite de l'allaitement est possible, mais tout symptôme survenant chez le nourrisson devra être signalé au médecin : muguet, éruption de boutons, etc. pouvant traduire une intolérance ou une allergie.

### Posologie et mode d'administration :

**Posologie :** Les comprimés peuvent être soit avalés directement avec un verre d'eau, soit délités dans un demi-verre d'eau avant d'être absorbés.

Les repas ne modifient pas l'absorption du médicament, qui peut donc être pris à n'importe quel moment de la journée.

**Posologie usuelle :** Elle varie en fonction des indications.

**Adulte :** 1 à 2 g par jour, répartis en 2 ou 3 prises.

Dans certaines infections, la posologie peut être doublée.

Dans l'éradication d'*Helicobacter pylori* chez l'adulte : 1 g, 2 fois par jour, en association avec un autre antibiotique et un antilucéux.

### Enfant :

La posologie usuelle est la suivante :

• Enfant < 30 mois : 50 à 100 mg/kg/jour, en 3 prises espacées de 8 heures.

• Enfant > 30 mois : 25 à 50 mg/kg/jour en 2 ou, mieux, en

3 prises, sans dépasser la posologie de 3 g/jour.

Pour les infections plus sévères, ainsi que pour les endocardites et les septicémies (en relais de la voie injectable) : la posologie peut être augmentée jusqu'à 150 mg/kg/jour en 3 ou 4 prises, sans dépasser la posologie de 6 g/jour.

### Effets indésirables :

Nausées, vomissements, diarrhée, candidose.

### Rarement :

- Réactions allergiques : éruption cutanée, œdème de Quincke, choc allergique (exceptionnel) ;

- Insuffisance rénale, anomalie de la numération formule sanguine, augmentation des transaminases.

**SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

### LISTE I.

**NE PAS DEPASSER LES DOSES PRESCRITES  
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS  
GROUPE SAIDAL - ANTIBIOTICAL  
MEDEA**