# CARDAXEL BGL

*Candésartan cilexetil*
*Comprimés sécables.*

**CARDAXEL BGL 8 mg** : Boite de 30 comprimés sécables.
**CARDAXEL BGL 16 mg** : Boite de 30 comprimés sécables.

**COMPOSTION :**

**CARDAXEL BGL 8 mg** Chaque comprimé contient Candésartan cilexetil …….. **8 mg**
**CARDAXEL BGL 16 mg** Chaque comprimé contient Candésartan cilexetil …….. **16 mg**
**Excipients** : QSP pour un comprimé sécable.

**CLASSE PHARMACEUTIQUE**

Médicament agissant sur le système rénine-angiotensine/ antagoniste de l'Angiotensine II.

**DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Agit sur le système rénine-angiotensine qui joue un rôle important dans l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression artérielle élevée, sans cause évidente) et dans l'insuffisance cardiaque en association avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion (autre médicament utilisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque) ou en cas d'intolérance à un traitement par un inhibiteur de l'enzyme de conversion.

**ATTENTION !**

**Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- à partir du 2ème trimestre de la grossesse,
- en cas d'allergie à l'un des constituants de ce médicament,
- dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, en cas de :
  - kaliémie (taux de potassium dans le sang) >5 mmol/l
  - créatininémie (taux de créatinine dans le sang) > 265 micromole/l ou une Clairance de la créatinine < 30ml/min (calculée a partir de la formule de cockroft).

Sauf avis contraire de votre médecin, ce médicament est déconseillé :
- si vous prenez certains diurétiques (spironolactone, éplérénone, amiloride, triamtérène par exemple), des sels de potassium ou de lithium (voir rubrique interactions médicamenteuses),
- au cours de l'allaitement

**MISES EN GARDE SPECIALES**

Informez votre médecin ou votre pharmacien des maladies ainsi que des allergies que vous avez ou que vous avez eues, en particulier :
-maladie des reins : insuffisance rénale, rétrécissement des artères rénales, transplantation, hémodialyse ;
-maladie du cœur : sténose des valves aortique ou mitrale, cardiomyopathie, insuffisance cardiaque congestive sévère ;
-Diabète ;
-maladie du foie ;
-troubles de la circulation sanguine au niveau du cerveau ;
-Hyperaldostéronisme primaire ;
-hyperkaliémie (augmentation de taux de potassium dans le sang).

Dans certains cas, votre médecin pourra être amené à surveiller périodiquement le taux de potassium et sodium sanguins ainsi que votre fonction rénale (taux d'urée et de créatinine sanguins).

Informez également votre médecin si vous avez présenté récemment des vomissements ou des diarrhées en quantité importante ou si vous prenez des médicaments tels que des diurétiques.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de la malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactose (maladies métaboliques rares).

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez CARDAXEL BGL. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, ce médicament peut provoquer une baisse de votre pression artérielle.

Votre traitement antihypertenseur doit donc être pris régulièrement comme vous l'a prescrit votre médecin.

De plus, il est désormais reconnu que certains facteurs peuvent jouer un rôle néfaste sur la pression artérielle et participer ainsi à l'aggravation de l'hypertension, principalement le tabac, l'excès de poids, le diabète, un taux élevé de cholestérol et de triglycérides dans le sang, la consommation excessive de sel, de réglisse.

Si votre médecin a jugé nécessaire de réduire l'un de ces facteurs, vous devez rigoureusement suivre ses conseils et considérer cela comme un complément à votre traitement.

**Interactions médicamenteuses et autres interactions :**

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, notamment si vous prenez certains types de diurétiques (spironolactone, éplérénone, amiloride, triamtérène seul ou associés), des sels de potassium ou de lithium (médicament du système nerveux), il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours a votre médecin ou a votre pharmacien.

**Grossesse-allaitement :**

**Grossesse :**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament au cours du 1er trimestre de la grossesse. Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, prévenez votre médecin avant de prendre CARDAXEL BGL.

CARDAXEL BGL est contre-indiqué durant le 2ème le 3ème trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin afin qu'il adapte votre traitement.

**Allaitement :**

L'allaitement est déconseillé en cas de traitement par ce médicament. Demandez conseils à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Conducteurs et utilisateurs de machines :**

Lors de la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines, la survenue possible de vertiges ou de fatigue au cours du traitement doit être prise en compte.

**Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :** Lactose monohydrate.

**Comment utiliser ce médicament :**

**Posologie :**

***Dans l'hypertension artérielle :***

Prenez CARDAXEL BGL chaque jour, en respectant strictement la prescription de votre médecin.

La dose habituelle est de 1 comprimé par jour, en une seule prise. En fonction de l'évolution de la valeur de votre pression artérielle, il appartiendra à votre médecin de modifier ou non la dose prescrite.

***Dans l'insuffisance cardiaque :***

La dose habituelle est de 4 mg par jour en début de traitement. La dose est ensuite augmentée progressivement, jusqu'à 32 mg par jour ou jusqu'à la dose maximale tolérée.

**Mode et voie d'administration :**

Voie orale.

CARDAXEL BGL peut être avalé avec un peu d'eau pendant ou entre les repas.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :

CARDAXEL BGL doit être pris tous les jours. Essayer de prendre CARDAXEL BGL chaque jour au même moment pour éviter tout oubli.

**Durée de traitement**

L'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque sont des maladies chroniques qui nécessitent un traitement prolongé. Il est donc particulièrement important que vous preniez ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous l'a demandé.

**Conduite à tenir en cas de surdosage**

Si vous avez dépassé la dose prescrite, prévenez immédiatement votre médecin, afin qu'il vous donne son avis rapidement.

**Conduite à tenir au cas ou l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise**

Prenez CARDAXEL BGL chaque jour comme cela vous a été prescrit.

Toutefois, si vous avez oublié de prendre ce médicament, ne prenez pas un comprimés en plus mais poursuivez votre traitement normalement.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous oublié de prendre.

**Effets non souhaites et gênants :**

Comme tout médicament, ce produit peut, chez certaines personnes, entrainer des effets plus ou moins gênants.

Ont été rapportés : vertiges, céphalées (maux de tête), nausées, hépatites, angio-œdème (gonflement de la face, des lèvres de la langue et/ou du larynx entrainant une difficulté à respirer ou a avaler, gonflement des mains ou des pieds)., démangeaisons importantes, éruption cutanées, douleurs dorsales, arthralgies (douleurs des articulations), myalgies (douleurs musculaires), altération de la fonction rénal pouvant aller jusqu'à l'insuffisance rénale chez des patients à risque, modifications du bilan biologique modification des taux sanguins de potassium, de sodium et des cellules sanguines (globules rouges et blancs), augmentation de la créatinine ou de l'urée dans le sang, augmentation de certains enzymes du foie.

Dans l'hypertension artérielle, ces effets sont généralement bénins et de courte durée.

Dans l'insuffisance cardiaque, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont altération de la fonction rénale, hyperkaliémie (augmentation du taux de potassium dans le sang), hypotension artérielle (baisse de la tension artérielle), augmentation de la créatinine et de l'urée sanguine. Aussi votre médecin sera amené à vous prescrire des contrôles périodiques des taux de potassium, de sodium, de créatinine et de l'urée dans votre sang.

Ces effets sont d'autant plus fréquents chez le sujet âgé (au dessus de 70 ans).En cas de diabète ou en cas d'association de plusieurs médicaments ayant le même mécanisme d'action que CARDAXEL BGL, tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et certains diurétiques également utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, ces effets indésirables peuvent conduire à une réduction de la dose de CARDAXEL BGL ou à l'arrêt du traitement et donc nécessiter un contrôle régulier de vos taux de potassium et de sodium sanguins ainsi que votre fonction rénale (taux d'urée et de créatinine sanguins).

Signalez a votre médecin ou a votre pharmacien tout effet non souhaite et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

**Conservation :**

Ne pas dépasser la date limitée d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

**Précautions particulières de conservation** :

Ce médicament doit être conservé à une température ne dépassant pas 30°C

Ne jamais laisser ce médicament a la portée des enfants.

Fabriqué par :
**Laboratoire BIO GALENIC**
**Zone Industrielle Zighoud Youcef**
**Constantine 25200 ALGERIE**