Imprimerie E L WASSIM **BON A TIRER**

Visa du client:

couleur: Bleu

150 mm



CO-NORTA 50mg/ 12,5 mg - CO-NORTAFORT 100mg/25mg

Losartan potassique +Hydrochlorothiazide

1. QU'EST-CE QUE CO-NORTA et CO-NORTAFORT?

Forme pharmaceutique CO-NORTA® 50 mg/12.50mg se présente sous forme de comprimés

CO-NORTAFORT® 100mg/25mg se présente sous forme de

Propriétés pharmacologiques

Antihypertenseur, association fixe d'un antagoniste de l'angiotensine II et d'un diurétique.

Composition

Chaque comprimé contient

Hydrochlorothiazide......12,5mg/25 mg

Excipients: Cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé Croscarmellose sodique, Stéarate de magnésium, Opadry II jaune Excipient à effet notoire:

Lactose monohydraté 60 mg/comprimé.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CO-NORTA et

CO-NORTA Fort?

(Indications thérapeutiques)
Traitement de l'hypertension artérielle essentielle, lorsqu'une monothérapie avec un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine

3. OUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE CO-NORTA et CO-NORTAFORT ? Contre indications

- Hypersensibilité à l'un des constituants ou aux dérivés sulfamides.
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/min).
- Insuffisance hépatique (cirrhose).
- Sténose bilatérale des artères rénales ou sténose artérielle rénale sur rein unique
- Femme enceinte ou qui allaite.

- Diurétiques hyperkaliémiants, potassique (sels de), lithium, médicaments à risque de torsades de pointe

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - En raison de la présence de lactose, «CO-NORTA et

- CO-NORTAFORT» ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliquement rares).
- Informez votre médecin ou votre pharmacien des problèmes médicaux en particulier, maladies du foie, rein ou du cœur, atteintes articulaires ou osseuses, gouttes, lupus érythémateux disséminés que vous avez ou que vous avez eu.
- Informez votre médecin ou votre pharmacien des éventuels traitements que vous prenez (en particulier les diurétiques) ou si vous suivez un régime particulier (régime sans sel par exemple). Si vous avez été traité avec des diurétiques ou si vous avez eu récemment des vomissements ou diarrhées en grande quantité, il est aussi important de le signaler.

Grossesse et allaitement

Vous ne devez pas utiliser «CO~NORTA et CO-NORTAFORT» si vous êtes enceinte.

Si vous êtes enceinte ou si vous le devenez alors que vous prenez «CO~NORTA et CO-NORTAFORT», arrêtez la prise de ce médicament et contactez votre médecin dès que possible. Vous ne devez pas utiliser «CO-NORTA et CO-NORTAFORT»

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de Votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

Interactions médicamenteuses.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. COMMENT UTILISER CO-NORTA et CO-NORTAFORT?

Posologie
Prenez «CO~NORTA et CO-NORTAFORT» chaque jour, exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. Il est important que vous preniez «CO-NORTA et CO-NORTAFORT» aussi longtemps que votre médecin vous l'a conseillé, afin de maintenir un contrôle régulier de votre pression artérielle. La dose habituelle de «CO-NORTA et CO-NORTAFORT» chez la plupart des

patients est d'un comprimé par jour pour contrôler la pression artérielle pendant 24 heure

Mode et voie d'administration

Par voie orale. «CO-NORTA et CO-NORTAFORT» peut être pris pendant ou entre les repas. Pour des raisons pratiques et pour vous aider à vous en souvenir, essayez de prendre «CO-NORTA et CO-NORTAFORT» chaque jour au même moment. L'hypertension artérielle est une maladie chronique qui nécessite un traitement prolongé.

Durée de traitement: dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription de votre médecin.

Surdosage: Si vous avez dépassé la dose prescrite, prévenez immédiatement votre médecin, afin qu'il vous donne son avis

5. QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES *OU GÊNANTS ?*

Certains patients peuvent avoir des étourdissements, une baisse de la tension artérielle lors de la mise en position debout pouvant l'accompagner de vertige, une diarrhée.

Un angioedème a été rarement observé (gonflement du visage des lèvres, du larynx et/ ou de la langue) qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler: dans ce cas, arrêter de prendre «CO-NORTA et CO-NORTAFORT» et consulter immédiatement votre médecin. Une aggravation d'un lupus érythémateux disséminé préexistant peut se voir sous «CO-NORTA et CO-NORTAFORT». On a également rapporté les effets indésirables suivants des troubles neurologiques en cas d'insuffisance hépatique, des troubles digestifs (nausées, constipation, diarrhée), des éruptions cutanées, céphalées, vertiges, fatigue, fourmillement des extrémités, exceptionnellement une pancréatite.

Biologiquement une augmentation modérée de la créatinine plasmatique et de l'urée sanguine a été observée chez certains patients, réversible à l'arrêt du traitement. On a rapporté aussi une augmentation ou une diminution de la kaliémie, une diminution de la natrémie, une élévation de l'uricémie (taux sanguin d'acide urique) et de la glycémie, des troubles hématologiques et entionnellement une élévation de la calcémie

6. COMMENT CONSERVER CO-NORTA et CO-NORTAFORT ?

A conserver à une température inférieure à 30°C

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement extérieur.

7. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE ? Liste I, sous ordonnance médicale

8. PRESENTATION ET NUMERO DE D.E.

| Spécialité | Présentation | N° D.E. |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| CO-NORTA CO-NORTA Fort | Boîte de 30 comprimés | 11/06E167/317 11/06E239/317 |

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres. Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa
- consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger. - Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le
- mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
 N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la
- période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

Fabriqué et Titulaire : les Laboratoires INPHA-MEDIS RN 44,Sidi Kaci - Ben M'hidi,El Tarf -Algérie.