150 mm

230 mm

NORTA 50 mg - NORTA Fort 100 mg

Losartan potassique

1. QU'EST-CE QUE NORTA 50mg - NORTA Fort 100mg ?

Forme pharmaceutique

NORTA 50 mg-NORTA Fort 100mg se présente sous forme de comprimés pelliculés sécables.

Propriétés pharmacologiques

Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (type AT1).

Composition du NORTA et NORTA Fort

Chaque comprimé contient

Losartan potassique…….....…50 mg ou 100 mg

Excipients: Cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, Croscarmellose sodique, Stéarate de magnésium, Opadry II HP blanc.

Excipient à effet notoire :

Lactose monohydraté 40 mg/ comprimé.

2.DANS QUELS CAS UTILISER NORTA 50mg-NORTA Fort 100mg ? (Indications thérapeutiques)

Traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NORTA 50mg-NORTA Fort 100mg ?

Contre indications

Absolues:

- Hypersensibilité à l'un de ses constituants.
- Femme enceinte (2e et 3e trimestres) ou qui allaite.

Relatives:

- Diurétiques hyperkaliémiants, potassique (sels de), lithium.

Mises en garde spéciales

- En raison de la présence de lactose, **NORTA50 mg-NORTA Fort 100mg** ne doit jamais être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
- L'utilisation du **NORTA 50 mg-NORTA Fort100mg** est déconseillée chez l'enfant, en l'absence de données.

Précautions d'emploi

- Informez votre médecin ou votre pharmacien des problèmes médicaux ainsi que des allergies que vous avez ou que vous avez eu.
- Informez également votre médecin si vous suivez un régime sans sel, si vous avez eu récemment des vomissements ou diarrhées en grande quantité. Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous avez une maladie du foie, du cœur ou des reins ou si vous prenez des médicaments comme les diurétiques.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser **NORTA50mg-NORTA Fort100mg** pendant le premier trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ou non la grossesse.

L'utilisation du **NORTA 50mg-NORTA Fort100mg** est contre indiquée aux 2e et 3e trimestres de la grossesse.

il n'exsite pas de données concernant le passage dans le lait maternel . Par mesure de précautions, il convient d'éviter d'utiliser **NORTA 50mg-NORTA Fort 100mg** pendant l'allaitement.

Interactions médicamenteuses

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. COMMENT UTILISER NORTA 50mg-NORTA Fort 100mg ?

Mode d'administration

Voie orale. **NORTA 50mg-NORTA Fort 100mg** peut être pris lors d'un repas ou à jeun.

Posologie

Prenez **NORTA 50mg-NORTA Fort 100mg** chaque jour, exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. Il est important que vous preniez ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous l'a conseillé, afin de maintenir un contrôle régulier de votre pression artérielle.

- Chez la plupart des patients, la posologie est de 50 mg une fois par jour, aussi bien en début de traitement qu'en traitement d'entretien.

L'effet antihypertenseur atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement.

- En cas de réduction de la volémie (due par exemple à un traitement diurétique préalable), il faut prendre des précautions particulières et diminuer la dose à 25 mg une fois par jour comme posologie initiale.
- La posologie initiale est inchangée chez les sujets âgés et les insuffisants rénaux, même dialysés. Par contre, une posologie plus faible peut être indiquée en cas d'antécédents d'atteinte fonctionnelle hépatique.

NORTA 50mg-NORTA Fort 100mg peut être associé à d'autres Antihypertenseurs, en particulier les diurétiques avec lesquels une synergie additive partielle a été démontrée.

Surdosage :

Si vous avez dépassé la dose prescrite, prévenez immédiatement votre médecin, afin qu'il vous donne son avis rapidement.

5. QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES OU GENANTS ?

Certains patients peuvent avoir des étourdissements, une baisse de la tension artérielle lors de la mise en position debout pouvant s'accompagner de vertiges, une diarrhée.

Un angioedème a été rarement observé (gonflement du visage, des lèvres, du larynx et/ou de la langue) qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler: dans ce cas , arrêter de prendre **NORTA50mg-NORTA Fort 100mg** et Consulter immédiatement votre médecin.

Biologiquement une augmentation modérée de la créatinine plasmatique et de l'urée sanguine a été observée chez certains patients, réversible à l'arrêt du traitement. On a également observé un taux anormalement élevé de potassium dans le sang, une baisse modérée du taux d'acide urique dans le sang et une augmentation de l'élimination dans les urines de l'acide urique.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

6. COMMENT CONSERVER NORTA-NORTA Fort ?

A conserver à une température inférieure à 30°C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement extérieur.

7. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE?

Liste I, sous ordonnance médicale.

8. PRESENTATION ET NUMERO DE D.E.

Spécialité	Présentation	N° D.E.
NORTA50mg NORTA Fort100mg	Boîte de 30 comprimés	10 / 06 E 126 / 317 11 / 06 E 240 / 317

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

Fabricant et Titulaire de la D.E
Les laboratoires INPHA-Médis
Siège sociale : 08,Rue Prosper Dubourg,Annaba-Algérie
Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44,Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.