LOPRESS

Métoprolol tartrate à 100mg

Comprimés pelliculés quadrisécables

Composition :

Chaque comprimé pelliculé de LOPRESS 100mg contient :

Tartrate de métoprolol……...……100mg

Excipients : Stéarate de magnésium, Talc, Amidon, Glycolate de sodium, Aerosil, Microcristalline cellulose, dioxyde de titane, Hypromellose, Polyéthyléne glycol.

Classe pharmaco thérapeutique :

BETA-BLOQUANT SELECTIF

(C : système cardiovasculaire)

Indications thérapeutiques :

Lopress 100mg est préconisé principalement dans :

- L'hypertension artérielle,
- Prophylaxie des crises d'angor d'effort.
- Infarctus du myocarde en phase aigue (en relais du métoprolol injectable),
- Traitement au long cours après infarctus du myocarde (réduction de la mortalité),
- Traitement de certains troubles du rythme: supraventriculaires (tachycardies, flutters et fibrillations auriculaires, tachycardies jonctionnelles) ou ventriculaires (extrasystolie ventriculaire, tachycardies ventriculaires).
- Manifestations fonctionnelles cardiaques : éréthisme cardiaque.

Posologie :

La posologie est variable en fonction de l'affection traitée, elle est aussi adaptée à chaque patient.

La posologie usuelle est de 100mg à 200mg par jour en une ou deux prises.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Mode et voie d'administration :

Voie orale. Avaler les comprimés sans les croquer, avec un verre d'eau, pendant ou juste après les repas.

Durée du traitement :

Ce traitement doit être suivi régulièrement. Ne pas l'interrompre sans l'avis de votre médecin. Dans la majorité des cas, il sera prolongé plusieurs mois ou années parfois il ne dure que quelques semaines : c'est votre médecin qui vous le précisera.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

Prévenir immédiatement votre médecin.

Contre indications :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives, dans leurs formes sévères.
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement.
- Choc cardiogénique.
- Blocs auriculoventriculaires des deuxième et troisième degrés non appareillés.
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie).
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).
- Bradycardie (< 45-50 batt/min).
- Phénomène de Raynaud et troubles circulatoires périphériques, dans leurs formes sévères.
- Phéochromocytome non traité.
- Hypotension.
- Hypersensibilité au métoprolol.

- Antécédent de réaction anaphylactique.
- Association avec la floctafénine et le sultopride.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en gardes spéciales :

L'arrêt brutal du traitement peut entraîner des complications cardiaques**.** NE JAMAIS ARRETER BRUTALEMENT LE TRAITEMENT SANS L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

Précautions d'emploi :

Il convient de prévenir votre médecin en cas de : diabète, maladie cardiovasculaire, syndrome de Raynaud, asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives, psoriasis, insuffisance hépatique, phéochromocytome ou maladie de la thyroïde.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, avertissez l'anesthésiste que vous prenez ce médicament.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses :

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment en cas d'association avec la floctafénine, sultopride, amiodarone, vérapamil, bépridil, et le diltiazem, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Ce médicament peut être pris pendant la grossesse en cas de besoin.

L'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement en raison du passage de ce médicament dans le lait maternel.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

Sportifs :

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage.

Effets indésirables :

COMME TOUS PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

<u>Sur le plan clinique :</u>

Les effets les plus fréquents : Asthénie, Refroidissement des extrémités, bradycardie, troubles digestifs (gastralgies, nausées, vomissements), insomnie, cauchemars, impuissance.

Les effets rarement rapportés : Ralentissement de la conduction auriculoventriculaire ou intensification d'un bloc auriculoventriculaire existant, insuffisance cardiaque, chute tensionnelle, bronchospasme, hypoglycémie, syndrome de Raynaud, aggravation d'une claudication intermittente existante, diverses manifestations cutanées y compris l'éruption psoriasiforme ou exacerbation d'un psoriasis, sécheresse ou irritation oculaire.

Exceptionnellement : Fibrose rétropéritonéale, maladie de la Peyronie.

<u>Sur le plan biologique:</u>

Exceptionnellement peuvent survenir des anticorps antinucléaires ne s'accompagnant qu'exceptionnellement de manifestations chroniques à type de syndrome lupique.

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

Forme et présentation :

Boite de 30 comprimés pelliculés quadrisécables.

Conservation :
Conserver entre 15-30 C° dans un endroit sec.
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Ne jamais laisser le médicament à la portée des enfants

LISTE I
D.E N°: 05/06 F 204/121
Date de révision de la notice: Avril 2010

Fabricant et détenteur de D.E:
ASIA Pharmaceuticals Labs(S.A.R)

Conditionné par :
SANAMED -45, Zone d'activité de Zeralda- ALGER