CIPTADINE®

Cyproheptadine HCl
Comprimés sécables
par voie orale

ACTION
Ciptadine (Cyproheptadine HCl) est un antagoniste de l'histamine et de la sérotonine avec des effets sédatifs et anticholinergiques.

COMPOSITION
par Comprimé
Cyproheptadine ..... 4 mg
(Sous forme de chlorhydrate: 44 mg)
Excipients: Lactose Hydraté, Amidon de pomme de terre, Povidone, Dioxyde de Silicone colloïdal, Stéarate de Magnésium.
Excipients à effet notoire: Lactose.
Ciptadine 4mg comprimés sécables DE: 09/03/14F025/001

INDICATIONS
Comme anti-allergique et anti-prurit: Ciptadine peut être utilisée dans le traitement du prurit et des allergies aigues et chroniques telles que: dermatites, eczéma, dermatite eczémateuse, dermographisme, réactions allergiques locales aux piqûres d'insectes, rhume des foins et autres rhinites saisonnières, allergies aux plantes et rhinites vasomotrices, conjonctivites allergiques dûes aux allergènes inhalés et à l'alimentation, urticaire, oedème angioneurotique, réactions aux médicaments et au sérum, prurit anogénital, varicelle.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Anti-allergique et Anti-prurit:
Adultes: 4 mg, 3 à 4 fois par jour. Ne pas dépasser 32 mg par jour.
Enfants: (7-14 ans): 4 mg trois fois par jour. Ne pas dépasser 16 mg par jour.

CONTRE-INDICATIONS
La Cyproheptadine est contre-indiquée dans le glaucome, dans les prédispositions de la rétention urinaire, chez les patients souffrant d'ulcère peptique, sténose ou d'obstruction pyloroduodénale, hypertrophie prostatique ou obstruction de la vessie.
Ce médicament ne doit pas être prescrit chez les patients âgés ou à faible poids corporel.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
MISE EN GARDE
- L'apparition de fièvre, angine ou infection impose d'avertir tout de suite le médecin traitant et contrôler immédiatement l'hémogramme.
- Peut entraîner une réaction faussement positive des tests de recherche d'antidépresseurs tricycliques dans les urines.

PRECAUTIONS
Les antihistaminiques sont susceptibles de causer des vertiges, sédation et hypotension chez les sujets âgés. Paradoxalement, en particulier chez les jeunes enfants, ils peuvent occasionnellement produire une agitation.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Les inhibiteurs des MAO prolongent et potentialisent les effets anticholinergiques des antihistaminiques.
Les patients doivent être mis en garde contre la prise d'alcool et tout autre dépresseur du système nerveux central.
- Médicaments contenants de l'alcool.
- Atropine et substances atropiniques.
- Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse : L'utilisation de ce médicament est déconseillée tout au long de la grossesse.
Allaitement : il existe un passage faible, mais réel, de la cyproheptadine dans le lait maternel. Compte tenu des possibilités de sédation ou d'excitation paradoxale du nouveau-né liées à la cyproheptadine, l'allaitement est déconseillé.

EFFETS INDESIRABLES
L'effet de somnolence disparaît après 3 à 4 jours de traitement continu. La somnolence est un effet souhaité par les patients souffrant de dermatites ou de prurit, du fait qu'elle augmente le seuil de perception et diminue la tension émotionnelle causée par la maladie ou l'anorexie. D'autres rares effets indésirables rapportés avec la cyproheptadine sont: sécheresse de la bouche, vertiges, agitation, faiblesse, sécheresse des muqueuses, céphalées, nausées, asthénie, excitation, irritabilité, tremblements, rash, oedème, insomnies, vomissements, photosensibilité, troubles épigastriques, diarrhée, palpitations, nervosité, troubles de la vue et thrombocytopénie. Hypotension orthostatique, mydriase, rétention urinaire, baisse de mémoire ou de concentration, tarissement de la sécrétion lactée, ictère, insuffisance hépatique, anémie hémolytique, hépatite cholestatique, ou cytolytique, augmentation de l'appétit et prise de poids.

CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver entre 15-25°C.

CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament est un produit qui affecte la santé, son administration sans avis médical peut être dangereuse.
- Suivre strictement la prescription médicale et les instructions du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien connaissent le médicament, ses bienfaits et ses risques.
- Ne pas interrompre le traitement prescrit.
- Ne pas reprendre le traitement sans avis médical.

HIKMA
QUALITY

Fabriqué et Conditionné par : HIKMA PHARMA ALGERIA
15,16 Zone Industrielle Staouéli - ALGERIE
Pour HIKMA PHARMACEUTICALS
B.P.No. 182400 AMMAN 11118 - JORDANIE

Tenir hors de la portée des enfants
2INCIP-AF-12/2010

سيبتادين ®

سيبروهيبتادين هيدروكلورايد
أقراص قابلة للقطع
عن طريق الفم

المفعول

إن سيبتادين (سيبروهيبتادين هيدروكلورايد) هو مضاد للسيروتونين والهيستامين والكولين وله فعالية مسكنة.

التركيبة

في القرص

سيبروهيبتادين ..... 4 ملغ

(على شكل كلورهيدرات 4,4 ملغ)

المواد المضافة: لاكتوز مائي، نشاء البطاطا، بوڤيدون، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، ستيرات المغنيسيوم.

المواد المضافة معروفة التأثير: لاكتوز.

رقم التسجيل:

Ciptadine 4mg comprimés sécables 09/03/14F025/001

دواعي الاستعمال

يستعمل سيبتادين في الحالات التالية:

الحساسية و الحكة : يمكن استعماله لمعالجة الحكاك والحساسية الحادة والمزمنة مثل التهاب الجلد الاكزيمي، الكتابة الجلدية، الحساسية الموضعية الناجمة عن لدغ الحشرات، حمى القش، التهاب الأنف الموسمي، الاديما الوعائية العصبية، الحساسية الناجمة عن استعمال الأدوية، و حكة الأعضاء الجنسية والحكاك الناتج عن جدري الماء.

الجرعة وطريقة الاستعمال

مضاد للحساسية و الحكة :

للكبار: 4 ملغ 3 - 4 مرات يوميا . يجب أن لا تزيد الجرعة عن 32 ملغ يوميا.

للصغار 7 - 14 سنة : 4 ملغ ثلاث مرات يوميا . يجب أن لا تزيد الجرعة عن 16 ملغ يوميا.

مضادات الاستعمال

لا يستعمل سيبتروهيبتادين في الغلوكوما، حصر البول، القرحة الهضمية، انسداد الأمعاء، وأعراض تضخم البروستات أو انسداد عنق المثانة.

كذلك لا يوصف للمرضى كبار السن ضعيفي البنية . إن مضادات الهستامين يجب أن لا تستعمل للأمهات المرضعات أو للأطفال حديثي الولادة.

يجب أن لا يستعمل سيبروهيبتادين لمعالجة نوبة داء الربو الحادة.

الاحتياطات

مضادات الهستامين قد تقلل من اليقظة العقلية وبالعكس في بعض الأحيان قد تسبب الإثارة خاصة عند الأطفال الصغار.

التداخلات الدوائية

إن مثبطات مونو أمينوكسيديز تطيل وتقوي من مفعول مضادات الحساسية المثبطة للكولين .

يجب تحذير المرضى من عدم تناول الكحول ومثبطات الجهاز العصبي المركزي أثناء المعالجة بهذا الدواء .

الحمل و الارضاع

الحمل : لا ينصح باستخدام هذا الدواء أثناء الحمل.

الارضاع : سيبروهيبتادين له مر ضعيف ولكن حقيقي من خلال حليب الأم لا ينصح بإرضاع الطفل حديث الولادة خلال تناول الأم للسيبروهيبتادين إذا كان هنالك احتمالية حدوث نعاس أو مفارقة إثارة.

التأثيرات الجانبية

إن العديد من المرضى الذين يعانون عند بدء المعالجة قد لا يشكون منها بعد الثلاثة أو الأربعة أيام الأولى من المعالجة المستمرة، كما أن الدوخة غالبا ما تكون ذات تأثير مرغوب به للمرضى المصابين بالتهاب الجلد أو الحكة لأنها تؤدي إلى نقص في الإدراك الحسي ومن الممكن أن تنقص من التوتر العاطفي الناتج عن المرض أو فقدان الشهية.

جفاف الفم، الدوخة، النرفزة العصبية، الإغماء، جفاف الأغشية، الصداع، الغثيان، الإرهاق، التهيج، حدة الطبع، الارتعاش، الطفح الجلدي والاوديما، الأرق، الفيء، الحساسية للضوء، الألم المعدي، الإسهال، سرعة خفقان القلب، الارتخاء، تشوش الرؤية، نقص الصفيحات الدموية، زيادة الشهية وزيادة الوزن.

ظروف التخزين

يحفظ بين 15 - 25 ° مئوية.

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- ان الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

إنتاج و تعبئة : حكمة فارما الجزائر
15-16 المنطقة الصناعية، سطاوالي – الجزائر
لشركة أدوية الحكمة
ص.ب : 182400 عمان 11118 – الأردن

حكمة
الدواء الثقة

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

2INCIP-AF-12/2010