

CALPEROS® 500 mgCarbonate de calcium
Comprimé à sucer sécable

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**COMPOSITION**

Carbonate de calcium 1250 mg

quantité correspondant

à calcium élément 500 mg

Excipients : Povidone, aspartame, arôme menthe, croscarmellose sodique, talc, stéarate de magnésium, xylitol pour un comprimé à sucer sécable.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé à sucer sécable. Boîte de 60 comprimés à sucer.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

CALCIUM / ÉLÉMENT MINÉRAL

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE**DE LA DÉCISION D'ENREGISTREMENT**

BOUCHARA-RECORDATI

70 Avenue du Général de Gaulle - 92 800 PUTEAUX - France

FABRICANT

Lab. BOUCHARA-RECORDATI - 03410 St Victor - France

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament apporte du calcium.

Ce médicament est préconisé dans :

- Les déficits en calcium en période de croissance, de grossesse, d'allaitement.
- Les traitements d'appoint de l'ostéoporose (déminéralisation osseuse).

ATTENTION !**DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Allergie à l'un des constituants.
- Hypercalcémie (taux anormalement élevé du calcium dans le sang).
- Hypercalciurie (élimination exagérée de calcium dans l'urine).
- Lithiase calcique (calculs rénaux), calcifications tissulaires.
- Immobilisations prolongées s'accompagnant d'hypercalciurie et/ou d'hypercalcémie : le calcium ne doit être administré qu'à la reprise de la mobilité.
- Phénylcétonurie (maladie héréditaire détectée à la naissance), ce médicament contenant de l'aspartame.

MISES EN GARDE SPECIALES

Des apports excessifs en calcium peuvent être dangereux.

NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT SANS AVIS MEDICAL.**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale.
- En cas de traitement prolongé ou d'insuffisance rénale, il est nécessaire de faire contrôler régulièrement le taux de calcium dans les urines (calciurie) et dans le sang (calcémie). En fonction de celui-ci, votre médecin pourra être amené à réduire voire interrompre votre traitement.
- En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE : Aspartame.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?**POSOLOGIE**

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

La forme comprimé n'est pas adaptée à l'enfant de moins de 6 ans.

- Adultes : carence calcique en général et traitement d'appoint des ostéoporoses. Traitement d'entretien : 2 à 3 comprimés à sucer par jour.
- Enfants de plus de 6 ans : carence calcique en période de croissance : 1 à 2 comprimés à sucer par jour en fonction de l'âge.

DANS TOUS LES CAS "CONFORMEZ-VOUS STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale.

Sucer les comprimés.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A VOTRE CAS.
- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MEDICAL.
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

DUREE DU TRAITEMENT

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

SURDOSAGE

Soif, polyurie polydipsie, nausées, vomissements, déshydratation, hypertension artérielle, troubles vasomoteurs, constipation.

Traitement : arrêt de tout apport calcique et vitaminié D et réhydratation.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : Constipation, ballonnements (flatulences), nausées, rots.

En cas de traitement prolongé à forte dose : risque de modification du taux de calcium dans le sang.

SIGNEALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Septembre 2013.

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants.

CALPEROS® 500 mg

Calcium carbonate

Tablet to be sucked

Please, read carefully this leaflet before taking this medicine. If you have questions, or a doubt ask for more information to your doctor or pharmacist. Keep this leaflet, you could need to refer to it again.

IDENTIFICATION OF THE MEDICINAL PRODUCT**COMPOSITION**

Calcium carbonate 1250 mg

Equivalent of calcium 500 mg

Excipients: Povidone, aspartame, mint flavour, croscarmellose sodium, talc, magnesium stearate, xylitol for one scored tablet to be sucked.

PHARMACEUTICAL FORM

Scored tablet to be sucked. Box of 60 tablets to be sucked.

PHARMACOTHERAPEUTIC CLASS

CALCIUM / MINERAL ELEMENT.

NAME AND ADDRESS OF THE HOLDER

BOUCHARA-RECORDATI

70, avenue du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX - FRANCE

MANUFACTURER

Lab. BOUCHARA-RECORDATI - 03410 St Victor - France

WHEN TO USE THIS MEDICINE?

This drug brings calcium.

This drug is advised in:

- calcium deficiencies during period of growth, pregnancy and breast-feeding,
- in adjuvant treatment of osteoporosis (bone demineralization).

WARNING!**WHEN NOT TO USE THIS MEDICINE?**

This medicine must never be used in the following situations:

- Allergy to one of the ingredients.
- Hypercalcemia (abnormal high calcium level in the blood).
- Hypercalciuria (excessive urinary elimination of calcium).
- Calcic lithiasis (kidney stones), tissular calcifications.
- Long-term immobilization with hypercalciuria and/or hypercalcemia: calcic therapy must be used only at mobility recovery.
- Phenylketonuria (hereditary disease, identified at birth), as this medicine contains aspartame.

SPECIAL WARNINGS

Excessive intake of calcium may be dangerous.

DO NOT USE THIS MEDICINE WITHOUT MEDICAL ADVICE.**PRECAUTIONS FOR USE**

- In case of renal insufficiency, tell your doctor.
- In case of prolonged treatment or renal insufficiency, it is necessary to take regular measurements of the level of calcium in the blood and the quantity of calcium eliminated in the urine (calciuria).