PRECORTYL® 5 mg

PREDNISONE

FORME ET PRESENTATION :
Comprimés blancs, biconvexes.
Boite de 30 comprimés.

COMPOSITION :
PREDNISONE (DCI).....5 mg / comprimé
Excipients q.s.p.....1 comprimé
Excipient à effet notoire : Lactose

INDICATIONS :
Ce médicament est un corticoïde.
De par son effet anti-inflammatoire, ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections ou maladies inflammatoires .

CONTRE INDICATIONS :
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Infections à bactéries ou champignons lorsqu'elles ne sont pas traitées par un traitement spécifique par antibiotique ou antimycosique.
- Maladies dues à des virus (herpès, zona, hépatites)
- Goutte
- Ulcère digestif en évolution et sans traitement
- Certains troubles mentaux
- Certaines cirrhoses
- Hépatites aiguës A, B et autre types .

MISES EN GARDE :
Il est conseillé de suivre un régime riche en protides et en calcium associé à la vitamine D et pauvre en sucre.
-Prévenir votre médecin de toute autre maladie, surtout en cas d'hypertension artérielle, de diabète, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose, d'ulcère digestif (estomac, intestin, colon)
- Sportifs : Attention ! cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôle antidopage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
- La corticothérapie entraînant parfois une élévation de la tension artérielle due à une rétention hydrosodée, il est nécessaire de diminuer l'apport en sel alimentaire, voir le supprimer.
- Ne jamais arrêter brutalement le traitement mais diminuer progressivement les doses avant l'arrêt complet tout en suivant la prescription de votre médecin.
- Prévenir votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement .

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien en particulier certains médicaments pour le cœur, l'aspirine , les anticoagulants, les antidiabétiques, certains antibiotiques, les diurétiques hypokaliémiants et certains antiépileptiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :
Voie Orale
Toujours absorber les comprimés au cours des repas de préférence en une prise le matin

Traitement d'attaque à forte dose :
- Adulte : 0,35 à 1,2 mg/kg/ jour (à titre indicatif:4 à 14 comprimés).
- Enfant de plus de 06 ans : 0,5 à 2 mg/kg/jour (à titre indicatif: 2,5 à 10 comprimés).

Traitement d'entretien:
- Adulte : 5 à 15 mg/jour (à titre indicatif:1 à 3 comprimés).
- Enfant de plus de 06 ans : 0,25 à 0,5 mg/kg/jour (à titre indicatif : 1 à 2,5 comprimés pour un enfant de 25kg).

La posologie devant être adaptée à chaque sujet en fonction du diagnostic. Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES :
Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants à craindre surtout lors d'un traitement prolongé.
- Désordres hydroélectrolytiques
- Troubles endocriniens
- Troubles musculosquelettiques
- Troubles digestifs
- Troubles cutanés
- Troubles neuropsychiques
- Troubles oculaires

GROSSESSE ET ALLATTEMENT :
Grossesse :
Lors de maladies chroniques nécessitant un traitement tout au long de la grossesse, il est justifié d'observer une période de surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique du nouveau-né.
Allaitement :
Excrétés dans le lait maternel, les corticoïdes sont à éviter pendant l'allaitement.

Liste I
Médicament enregistré : 97/09H 038/003
Date de révision de la notice : Fevrier 2013

CECI EST UN MÉDICAMENT
- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit .
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contres indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas , n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin .

NE JAMAIS LAISSER LES MÉDICAMENTS A LA PORTÉE DES ENFANTS

Fabriqué par Groupe Industriel SAIDAL - Site de production Dar El Beida - ALGERIE

ICPC BouFlous