# MAALOX®

suspension buvable en flacon
Hydroxyde de magnésium, Hydroxyde d'aluminium

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**1.QU'EST-CE QUE MAALOX®, suspension buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**
**Indications thérapeutiques : C**e médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et remontées acides.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAALOX®, suspension buvable en flacon ?**
**Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
**Contre-indications : Ne prenez jamais MAALOX®, suspension buvable en flacon en cas:**
- d'antécédents d'allergie à l'un des composants de la suspension buvable,
- maladie grave du rein.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
**Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**
Faites attention avec MAALOX®, suspension buvable en flacon**:**
**Mises en garde spéciales**
Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin:
- si vos troubles sont associés à une perte de poids,
- si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,
- si vous soufrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,
- si vous avez une maladie des reins (insuffisante rénale) ou si vous êtes dialysé, vous devez consulter un médecin car MAALOX®, suspension buvable en flacon contient de l'aluminium et du magnésium. L'accumulation de d'aluminium et de magnésium peut entrainer une maladie neurologique grave (encéphalopathie).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle et peut provoquer des réactions allergiques.
**Précautions d'emploi**
Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
**Interactions avec d'autres médicaments**
**Prise ou utilisation d'autres médicaments**
Il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament. Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).
**Ce médicament contient des antiacides (hydroxyde d'aluminium et hydroxyde de magnésium). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Comment utiliser MAALOX, suspension buvable en flacon).**
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**
**Grossesse et Allaitement**
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
**Liste des excipients à effet notoire**
**Liste des excipients à effet notoire: Sorbitol (E420), Parahydroxybenzoate de méthyle (E218), Parahydroxybenzoate de propyle (E 216).**

**3. COMMENT PRENDRE MAALOX®, suspension buvable en flacon ?**
**Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**
**Posologie/Mode d'administration/Fréquence d'administration/Durée de traitement**
**Voie orale. RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans).**
1 cuillère à soupe au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides, sans dépasser 6 cuillères à soupe par jour.
**La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.**
**Symptômes et instructions en cas de surdosage**
**Si vous avez pris plus de MAALOX®, suspension buvable en flacon que vous n'auriez dû:**
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Le surdosage de magnésium par voie orale n'entraîne pas, en général, de réactions toxiques en cas de fonctionnement normal du rein. L'intoxication au magnésium peut, toutefois, se développer en cas d'insuffisance rénale.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**
**Description des effets indésirables**
Comme tous les médicaments, MAALOX®, suspension buvable en flacon est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Possibilité de:
- troubles digestifs (diarrhées ou constipation),
- diminution du taux de phosphore dans le sang en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**5. COMMENT CONSERVER MAALOX®, suspension buvable en flacon ?**
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
**Date de péremption**
**Ne pas utiliser MAALOX®, suspension buvable en flacon après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.**
**Conditions de conservation : Pas de précautions particulières de conservation.**
**Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

**6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**
**Liste complète des substances actives et des excipients**
**Que contient MAALOX®, suspension buvable en flacon ?**
**Les substances actives sont:**

Hydroxyde de magnésium ..... 4,00 g

Hydroxyde d'aluminium ..... 3,50 g
Pour 100 ml.
**Les autres composants sont:**
Acide chlorhydrique concentré, acide citrique monohydraté, huile essentielle de menthe poivrée, D-Mannitol, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, saccharine sodique, sorbitol à 70 % (non cristallisable), eau purifiée**.**
**Forme pharmaceutique et contenu**
**Qu'est-ce que MAALOX®, suspension buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur ?**
Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable. Flacon de 250 ml

**Titulaire :**
**Sanofi aventis Algérie spa ( Micro Zone d'activité Bt B Lots 29,30,31 Hydra Alger –Algérie)**

**Fabricant :**
**Sanofi aventis Algérie spa(Route Nationale N°11 Ain Benian –Alger-Algerie )**

**Date de mise à jour : 23/01/2012**

**CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE**

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.
Les brûlures d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.
Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes:
- évitez les repas abondants et riches en graisses,
- évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,
- variez votre alimentation,
- normalisez votre poids et faites de l'exercice,
- évitez la pratique d'un effort important juste après le repas,
- évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool.

**VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS. N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS**
**NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS**

455682